

utmira Butmira Butmir

舒咳寧

液0.8毫克/毫升

Butmira Liquid 0.8mg/mL
(Butamirate Citrate)

【成分】每毫升中含：

Butamirate Citrate.....0.8 mg

【適應症】

鎮咳（感冒、支氣管炎、氣喘性支氣管炎所引起之咳嗽）。

【用法用量】

成人：每次7.5 mL，每日3~4次。

兒童：每次5 mL，每日3次。

本藥須由醫師處方使用。

【藥理作用】依文獻刊載

1. Butamirate Citrate是一種與鴉片所含的生物鹼在化學上均無相似之處的止咳鎮靜劑。Butamirate Citrate除了有顯著的止咳作用外，還能夠逐漸改善呼吸道受阻的程度，這一點可以從患者肺活量的逐漸增加獲得證明。
2. 口服Butamirate Citrate可以被人體迅速、完全的吸收。喝下150 mg的Butamirate液之後1.5小時，可測得主要代謝產物 phenyl-2-lactate在血漿中的最大濃度達6.4 µg/mL。Phenyl-2-lactate在血漿中濃度半衰期，約為6小時。
3. Butamirate的水解現象為主要被水解成Phenyl-2-lactate及 Diethylaminoethoxyethanol始於血漿中。這兩種代謝產物都具有止咳作用，而且和Butamirate一樣，很容易與血漿蛋白結合（約95%）。這就是它們在血漿中濃度半衰期之所以會很長的原因。Phenyl-2-lactate會經由水解被部分代謝，這3種代謝產物主要是經由腎臟排出體外，酸性代謝產物大部份會與尿酸結合。

【禁忌】依文獻刊載

服用限制：

對Butamirate Citrate過敏者禁用。

懷孕期 / 哺乳期：

懷孕危險等級B。這表示在動物身上進行的生殖試驗中，並未顯示特別嚴重的危險。但目前為止尚無孕婦試驗報告的發表。因此，為了安全起見，懷孕初期3個月內應避免服用此劑；3個月之後方可服用。另外，由於，缺乏關於本藥的主成分是否會從母體進入母乳內的資料，為了安全起見，母親在哺乳期間欲服用本藥，應特別小心。

【副作用】依文獻刊載

可能有嘔心、發疹、腹瀉、暈眩等現象（約1%的病人會出現此副作用）。請告知醫師，降低服用劑量可消除這些副作用。

【劑量過多】

服用過多劑量的本藥可能產生嘔心、嘔吐、體重下降、血壓降低等症狀。

劑量過多的緊急處理措施：給予活性碳、含鹽的瀉藥、一般的心臟呼吸措施急救。

【交互作用】依文獻刊載

目前尚未發現本藥會與其他藥物產生交互作用。

【賦形劑內容】

Glycerin、Citric Acid Anhydrous、Sodium Citrate、Sodium Benzoate、Sucralose、Sucrose、EDTA-Disodium、Sunset Yellow FCF、Fragrance Plum、Purified Water。

【保存上之注意】

- 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 於25°C以下密封儲存，請勿冰存並避免陽光直射。
- 請在有效期限內使用。

【包裝】

45~4000毫升HDPE瓶裝。

衛部藥製字第058546號 Code No.



PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司二廠
台南市新營區開元路154號

S0312