

“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

黴克頓[®] 乳膏 (克氯黴唑)
10毫克/公克
MYCOSTEN[®] Cream_{10mg/gm} (Clotrimazole) “*Sinphar*”
—— 黴菌治療劑 ——
(Antifungal Preparations)

Clotrimazole為抗黴菌劑，具有殺死黴菌作用，被用於治療香港腳、表層念珠菌感染。本基劑為乳膏，使用方便。

成份：每Gm含有：

Clotrimazole.....10mg

賦形劑：Cetyl Stearyl Alcohol、White Petrolatum、Liquid Petrolatum、Span 60、Tween 60、Methylparaben、Propylparaben、Propylene Glycol、Water Purified.

適應症：治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。
用法用量：2次/天，塗於患部。兒童不宜使用。

- 副作用：1.局部皮膚刺激及灼熱感。
2.過敏性皮膚炎。
3.紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

注意事項：

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 10.深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 11.黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。
- 12.一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情複發應停藥立即就醫。

警語：對藥物各成分過敏者不得使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第025136號

包裝：1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

PIC/S GMP



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
服務專線：(0800)021053-013151 website: <http://www.sinphar.com>

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN