



BK Cp-007  
衛署藥製字第037344號

伯基®  
(乙醯水楊酸)

腸溶微粒膠囊 100毫克

Bokey®  
(Aspirin)

Enteric-Microencapsulated  
Capsules 100mg

2.9cm

乙醯水楊酸(Acetyl Salicylic Acid, 以下簡稱ASA)是傳統用於解熱鎮痛的藥品, 近來隨著醫藥界的研究發現, ASA具有預防心臟病的功效, 經由研究更發現, ASA經低劑量投與後, 具有不可逆性阻斷Thromboxane A<sub>2</sub> (一種血管收縮素) 形成之作用, 而能減少血栓形成。但在高劑量下, ASA亦會抑制血管內皮中Prostacyclin (一種血管鬆弛素) 之生成。因此, 對於心肌梗塞之防治而言, 具有不利的影響。又市售一般乙醯水楊酸製劑之主成分含量常高達500mg, 因此, 心血管病患者, 常需將藥片剝成數片, 而造成投藥之不便及劑量之誤差。有鑑於此, 本公司特別研製低劑量乙醯水楊酸—伯基腸溶微粒膠囊, 以供長期防治心血管性疾之藥選擇。此外, 腸溶微粒劑型, 不但可降低藥物對胃腸之刺激性又可確保投藥後之有效性。因此, 伯基腸溶微粒膠囊適用於心血管性疾之防治。

**【成分】** 每膠囊中含：

Aspirin.....100mg

**【賦形劑】**

Sugar Starch、Hydroxypropyl cellulose、Methacrylic Acid Copolymer、Triacetin、Capsule #4 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Sunset Yellow FCF)。

**【作用】**

1. 本藥可經由促進環氧酶(Cyclo-oxygenase)之乙醯化而有效抑制循環內血小板Thromboxane之生成, 並進而緩解血管之痙攣及防止血小板之凝集。
2. 本藥之抗血小板凝集效應, 可延緩或降低血栓性血管疾病之發生及惡化。
3. 本藥亦可抑制Thromboxane於門脈循環中之生成, 且經由系統前代謝(肝代謝)後大多形成對血小板凝集不具影響性之代謝物Salicylate。因此, 進入全身循環內之Acetyl Salicylic Acid濃度極低, 故殆不會抑制Prostacyclin之形成, 而干擾藥效的發揮。
4. 本藥內含以Acetyl Salicylic Acid為主成分之腸溶微粒, 可防止藥物於胃中崩散而造成胃腸不適, 並可藉由微粒之穩定釋放效果, 使患者獲得更安全、更有效的治療成果。

**【適應症】**

預防心肌梗塞、預防血栓性血管病、短暫性缺血性發作。

**【用法·用量】**

每日1粒配服開水服用。  
本藥須由醫師處方使用。

**【禁忌症】**

1. 曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。
2. 嚴重肝、腎疾患、血友病或其他出血性疾患、糜爛性胃炎或消化性潰瘍患者禁用之。
3. 懷孕第3期婦女：不得使用。

**【警語】**

1. 雷氏徵候群(Reye's Syndrome)之病因不明, 經常發生於兒童或二十歲以下青少年罹患過急性病毒感染性疾患之恢復期中。其症狀包括嚴重嘔吐、嗜妄、昏迷等, 雖然其病例極為罕見, 但死亡率高達百分之二十至三十, 餘者亦可能發生永久性之腦損傷, 經研究發現, 乙醯水楊酸之使用與此症之發生有明顯之相關性。
2. 不得併服含酒精飲料, 因可能造成胃出血。
3. 本藥不宜使用於12歲以下兒童, 亦不宜使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病—雷氏症候群(Reye's Syndrome)有相關性。
4. 蠶豆症 (6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症, Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) 患者, 不宜服用本藥。

**【一般注意】**

1. 由於本藥使用後會延長出血時間, 故欲接受手術之患者應於手術前一週停藥。
2. 曾經因使用Acetyl Salicylic Acid發生氣喘之患者或消化性潰瘍患者應小心使用。
3. 本藥與抗凝劑併用時宜謹慎監測血液之凝集情形。

**【孕婦、授乳婦之投與】**

本藥使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立, 而懷孕末期之孕婦應避免服用。

**【新生兒、乳兒之投與】**

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全, 宜先權衡治療之必要性方始投與。

**【使用後之注意】**

本藥服用後, 若發生過敏或不適現象 (如發疹、搔癢等), 請立即停藥並請教醫師或藥師。

**【副作用】**

一般而言, 依指示每日服用1粒所產生之副作用極為輕微, 偶有胃腸不適、噁心、嘔吐、胃粘膜受損、潰瘍及隱發性血液流失現象, 而如眩暈、耳鳴、暫時性耳聾及代謝性酸中毒則與高劑量之投與有關。

**【保存上之注意】**

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

**【包裝】**

2~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2147700