

“強生” 氫氧化鋁膠錠 324 毫克

ALUMINUM HYDROXIDE TABLETS 324mg “JOHNSON”

內衛藥製字第 001706 號

- 【作用】**本藥品可以中和過多的胃酸。
- 【成分】**每一錠中含有：
有效成分及含量： Dried Aluminum Hydroxide Gel.....324mg
 單次劑量(2 錠)之酸中和能力為 10.0mEq 以上。
其他成分(賦形劑)： Corn Starch、HPC-L、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose 200、Neusilin UFL2、Primojel、Sodium Lauryl Sulfate
- 【用途(適應症)】**緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
 2. 未滿 3 個月之嬰兒。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 消化道潰瘍的人。
 2. 需限鹽飲食的人。
 3. 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
 4. 有慢性胃痛的人。
 5. 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 2. 與其他藥物併用時。
 3. 對於牛奶或乳製品耐受度低的人。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
 5. 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】飯後 1 小時及睡前或需要時服用。應嚼碎後吞服。

年 齡	劑 量
成人及 12 歲以上	1 次 2 錠，1 天服用 3~4 次
6 歲以上未滿 12 歲	1 次 1 錠，1 天服用 3~4 次
3 歲以上未滿 6 歲	1 次 1/2 錠，1 天服用 3~4 次
3 歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用

【警 語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
1. 若有任何不適情況產生。
 2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】12~1,000 錠 塑膠瓶裝。

【儲存條件】本藥應儲存於 25°C 以下，避光防潮之緊密容器。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。



Code No. : K-03

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市 241 三重區三和路四段 77、79 號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405