


仿單標籤粘貼表

產品名稱	吉多利錠 Ketosteril Tablets	申請廠商	台灣費森尤斯卡比股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥輸字第 018273 號		

104.5.15



吉多利錠 Ketosteril Tablets

衛署藥輸字第018273號
本藥須由醫師處方使用

[成份] 每一錠含

Calcium-3-methyl-2-oxo-valerate (α -Ketoanalogue to isoleucine, Calcium salt)	67 mg
Calcium-4-methyl-2-oxo-valerate (α -Ketoanalogue to Leucine, Calcium salt)	101 mg
Calcium-2-oxo-3-phenylpropionate (α -Ketoanalogue to Phenylalanine, Calcium salt)	68 mg
Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate (α -Ketoanalogue to Valine, Calcium salt)	86 mg
Calcium-DL-2-hydroxy-4-(methyl-thio)-butyrate (α -Hydroxyanalogue to Methionine, Calcium salt)	59 mg
L-Lysine-acetate (Δ 75 mg L-Lysine)	105 mg
L-Threonine	53 mg
L-Tryptophan	23 mg
L-Histidine	38 mg
L-Tyrosine	30 mg
 Total nitrogen content/tablet	 36 mg
Calcium/tablet	1.25 mmol Δ 0.05g

[適應症]
慢性腎不全時胺基酸之補給。

[禁忌症]
高血鈣症、胺基酸代謝紊亂。到目前為止尚無應用於孕婦及幼兒之報告。

[副作用]
偶有高血鈣症。應定期檢查血清鈣含量。應確定給予病患足夠的卡路里。

FKT-018273-0422

市售藥品得僅放置經審查核定之中文仿單。但如市售藥品同時放置中、外文仿單者，外文仿單內容須與核定本之中文仿單內容相符，廠商得依據核定之中文仿單自行修正其外文仿單內容。

※ 外文仿單應檢附中文譯文

仿單標籤粘貼表

產品名稱	吉多利錠 Ketosteril Tablets	申請廠商	台灣費森尤斯卡比股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	104.5.15	衛署藥輸字第 018273 號	



[相互作用]

含鈣藥品 (例如：acetolyte) 可能引起血清鈣含量病理性的增加。由於Ketosteril使尿毒症症狀減輕，若有服用氫氧化鋁應減量。注意血清磷酸鹽的減少。為了避免干擾吸收，勿同時投與易和鈣形成複合物的藥物 (例如：tetracycline)。

[用法用量]

口服。遵照醫師處方使用。或70公斤之成人，一次4到8錠，一天三次。餐中服用。

[使用時期]

腎絲球過濾率介於5-25 ml/min，且食物攝取含蛋白質 ≤ 40g/day (成人)。

[注意事項]

超過有效期限請勿使用，請置於兒童不易取得處。請同時配合醫師指示，限制每日蛋白質攝取量，以達到效果。

[包裝]

10-1500錠鋁箔片盒裝。

[賦形劑]

CORN STARCH
CROSPVIDONE
TALC (FRENCH CHALK)
SILICON DIOXIDE (SILICA GEL)
MAGNESIUM STEARATE
MACROGOL 6000
QUINOLINE YELLOW
EUDRAGIT E
TRIACETIN
TITANIUM DIOXIDE
POVIDONE



製造廠：Labesfal, Laboratórios Almiro, S.A.
廠址：Zona Industrial do Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugal
藥商：台灣費森尤斯卡比股份有限公司
地址：台北市大安區仁愛路三段32號5樓

藥品得僅放置經審查核定之中文仿單。但
同時放置中、外文仿單者，外文仿單
內容與核定本之中文仿單內容相符，廠商得
中文仿單自行修正其外文仿單內容。