



Molax Molax Molax Molax Molax

“皇家” 暢 服 內服液劑

Molax Oral Saline Laxative “Royal”

口服鹽類緩瀉劑

【適應症】 緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

【說明】 1.當緩瀉劑使用，可用來緩解偶發性便秘。

2.當通便清腸劑使用，可用於手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

- 一般在 30 分鐘至 6 小時內會產生排便。

- 直接服用時，緩瀉效果溫和，不會造成胃腸不適或刺激，在所屬適用年齡範圍內使用是非常的安全。

【主要成份】 每茶匙(5 毫升)含：

主要成份	用途
Monobasic Sodium Phosphate 2.4g	緩瀉/腸灌洗
Dibasic Sodium Phosphate 0.9g	緩瀉/腸灌洗

每茶匙含鈉 556 毫克，相當於每 ml 含鈉 111.2 毫克。

【賦形劑】 Lemon Flavor, Glycerin, Ginger ale, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, purified water。

Molax 無添加任何糖份。

【作用理論】 鹽類緩瀉劑能增加水份滯留於小腸，因而促進排便功能。

【用法用量】 本藥須由醫師處方使用

緩瀉劑： 當作緩瀉劑緩解偶發性便秘，劑量及使用方式如下表：

- 除非醫師建議，請勿使用過量（見警語）。每次服用不可超過 45ml 且儘可能多喝水以補充因瀉下所流失的水分。

- 服用量及方式：

年齡（歲）	步驟 1	步驟 2	24 小時最大劑量
成人、12 歲以上	15ml 藥液加入一杯約 240ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240ml 冷飲或水	45ml
10 & 11 歲	15ml 藥液加入一杯約 240ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240ml 冷飲或水	15ml
5 ~ 9 歲	7.5ml 藥液加入一杯約 240ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240ml 冷飲或水	7.5ml
5 歲以下	不可使用	不可使用	不可使用

* 24 小時內服用量勿超過上表所示劑量

醫療程序前清腸：

- 依醫師指示使用本產品作為清腸劑前，請確定醫師了解您的身體狀況及本產品的警語。服用劑量請以醫師建議劑量為主，並額外多補充清流液體以補充因瀉下所流失的水分——最少 240ml。

- 服用劑量：每次清腸使用二次 30ml 或 45ml，兩次劑量服用間隔為 10~12 小時。

- 每次服用方式：

年齡（歲）	步驟 1	步驟 2
成人、12 歲以上	30~45ml 藥液加入一杯約 240ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝 3 杯約 720ml 冷飲或水
10 & 11 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5 ~ 9 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5 歲以下	不可使用	不可使用

【警語】

- 24 小時內之服用劑量若超過建議劑量，可能引起傷害。

- 請勿使用於鬱血性心臟衰竭、腎臟疾病或 5 歲以下小孩。

- 懷孕、授乳、限鈉飲食或有任何醫療狀況者，請詢問過醫師後再使用。

- 若您正服用處方或非處方藥品，請先詢問過醫師或藥師後再使用。

- 若您有腹痛、噁心、嘔吐、排便習慣改變持續兩星期、已經服用其他瀉劑治療便秘超過一星期，請先詢問過醫師後再使用。

- 若您直腸出血、服藥後 6 小時腸未蠕動或出現脫水現象時，請停止使用並詢問您的醫師。早期脫水症狀包括嘔吐、眩暈或尿量比平常少，這些症狀也許是嚴重問題的徵兆（此時請大量補充水份）。

- 請存放在孩童不易取拿之處。如果過量或意外服用，必須立刻送醫。

【不良反應】

可能引起「電解質失衡」、「急性磷酸鹽腎病 (acute phosphate nephropathy)」、「紅疹」及「搔癢」等不良反應。

【其他資訊】

- 一茶匙(5ml)含：鈉 556mg，本產品不含任何糖份。

- 一般在服用後 30 分鐘至 6 小時會產生排便（視服用劑量不同而不同）。

- 放入冰箱冷藏可增加口感，但不可冷凍。

為安全起見，本品瓶口處均密封包裝，若封口鋁箔破損或不見，請勿使用。

包裝、儲存：4000 毫升以下塑膠瓶裝，25°C 以下儲存。



皇家化學製藥股份有限公司

ROYAL CHEM. & PHARM. CO., LTD.

高雄市鳥松區松埔路一巷 1 號電話：(07)7310537

傳真：(07)7310538