

當眠多[®]

膠囊15毫克 / 30毫克 (氟路洛)

Dalmadorm[®]

Capsules 15mg/30mg (Flurazepam)

睡眠誘導劑

成份：

flurazepam hydrochloride

賦形劑：

D-mannitol powder, D-mannitol granulated, talc, magnesium stearate
膠囊殼成分(15mg)：pharmaceutical gelatin, titanium dioxide, sodium lauryl sulfate, purified water, new coccin, tartrazine, sunset yellow FCF, brilliant blue FCF, (30mg)：pharmaceutical gelatin, titanium dioxide, sodium lauryl sulfate, purified water, new coccin, tartrazine, sunset yellow FCF, brilliant blue FCF, indigo carmine

性能：

在動物試驗中，此藥可提高對扁桃體和視丘刺激的覺醒閾，並且減低電刺激下視丘的感應反應。對於人體，此藥可縮短睡眠潛伏期，減少覺醒週期，因而增加睡眠時間。通常病人服藥後20分鐘內即可入睡，並能維持睡眠7—8小時。

適應症：

失眠。

劑量：

因當眠多可治各種型態之不眠症，劑量可依個別之症狀而調整，通常劑量是在15—60mg之間。一般成人劑量是睡前服用30mg，老年人及體弱者，開始劑量是15mg，再視其個別反應酌量遞加。

使用限制：

依賴性 (dependence) 禁斷症狀 (withdrawal)

在使用benzodiazepine類藥物之治療期時可能會產生依賴性，尤以下列患者較明顯如高劑量長期使用，患者先前有酒精中毒、藥物濫用、嚴重精神或人格異常等情形。為了減低依賴性的產生，投與當眠多時必須審慎確認症狀並避免長期投與，如需長期投與時必須評估其治療利益及風險並做定期之治療監測。

禁斷症狀的產生因人而異，可能從幾個小時到一週或更久，常見之症狀輕微者有戰慄、不安、失眠、焦慮、頭痛或精神不集中，有時盜汗，肌肉或下腹的痙攣、認知的異常等亦可能發生，精神錯亂或痙攣則較罕見。

當禁斷症狀發生時，病人需進一步的醫療控制及治療，避免突然斷藥應逐漸減少劑量。

使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時應注意可能產生的藥品相互作用。

注意事項：

當眠多跟其他安眠藥一樣，因個人的反應無法預測，服用期間必須避免喝酒。因劑量之改變和病人之敏感性而定，當眠多可能影響病人之某些反應，如駕駛行為能力等。當眠多如與中樞神經藥物併用時例如：神經治療劑、鎮靜劑、抗憂鬱劑、止痛劑和麻醉劑等合併使用，則應注意該藥可增強鎮靜效果。

警語：

服用本品可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。

包裝：

膠囊15mg，2—1000粒玻璃瓶裝

衛署藥製字第036679號

膠囊30mg，2—1000粒玻璃瓶裝

衛署藥製字第036677號

本藥須由醫師處方使用

請置於孩童取用不到之處

委託者：新加坡商美納里尼醫藥有限公司 台灣分公司

地址：台北市大安區敦化南路二段65號17樓

電話：02-2708-1863

製造廠：歐帕生技醫藥股份有限公司

廠址：新竹縣湖口鄉光復路1號

9128120.02



2013-MEN-121