

“晟德”
咳酚糖漿
 Guaphen Syrup
 “Center”
 20毫克/毫升
 20mg/ml
 (120ml)

【成分】：每毫升(ml)含有
 有效成分及含量：Guaifenesin...20mg
 其他成分(賦形劑)：Sucrose, Citric Acid Anhydrous, Ammonium Glycyrrhizinate, Aspartame, Benzoic Acid, Cherry Essence, New Coccine, Caramel(Sugar Burnt), Sodium Citrate

【用途(適應症)】：祛痰。

【不得使用的族群】：曾因本藥成分引起過敏的人、苯酮尿症的人、因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。

【用法用量】：一天4-6次，每次間隔至少4小時。
 成人及12歲以上，每次10毫升；6歲以上未滿12歲，每次5毫升；3歲以上未滿6歲，每次2.5毫升；3歲以下，請洽醫師診治。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

LOT：
 EXP：

本藥品適用藥害救濟制度

衛署藥製字第036094號

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠
 CENTER LABORATORIES INC.

新竹縣湖口鄉實踐路2號
 諮詢專線：(02)2655-8680

4 719256 000080



品名：晟德咳酚糖漿20毫克/毫升
 諮詢專線：(02)2655-8680

“晟德” 咳酚糖漿 20毫克/毫升
 Guaphen Syrup 20mg/ml “Center”

衛署藥製字第036094號

【成分】：每毫升(ml)含有
 有效成分及含量：Guaifenesin...20mg
 其他成分(賦形劑)：Sucrose, Citric Acid Anhydrous, Ammonium Glycyrrhizinate, Aspartame, Benzoic Acid, Cherry Essence, New Coccine, Caramel(Sugar Burnt), Sodium Citrate

【用途(適應症)】：祛痰。

【使用上注意事項】：

1. 有下列情形者，請勿使用：
 (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 (2) 苯酮尿症的人，因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。

2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 (1) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
 (2) 3歲以下。

3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

4. 其他使用上注意事項：
 (1) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
 (2) 避免陽光直射。
 (3) 勿超過建議使用量。
 (4) 使用前須振搖均勻，並使用所附量器量取藥量。
 (5) 不得與含酒精飲料併用。

晟德大藥廠(股)公司
 地址：台北市南港區園區街3-2號7樓
 晟德大藥廠(股)公司新竹廠
 廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號
 諮詢專線：(02)2655-8680

【用法用量】：
 一天4-6次，每次間隔至少4小時。

年齡	每次用量
成人及12歲以上	10毫升
6歲以上未滿12歲	5毫升
3歲以上未滿6歲	2.5毫升
3歲以下	請洽醫師診治

【警語】：
 1. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 (1) 若有任何不適情形產生。
 (2) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

【包裝】：10-4000毫升塑膠瓶裝
 【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品
 【儲存】：請密封儲存於25℃以下，請勿冰存。



品名：晟德咳酚糖漿20毫克/毫升
 用途(適應症)：祛痰。
 用法用量：
 一天4-6次，每次間隔至少4小時。
 成人及12歲以上每次10毫升
 6歲以上未滿12歲每次5毫升
 3歲以上未滿6歲每次2.5毫升
 3歲以下請洽醫師診治
 藥品劑型與特徵：糖漿；棕紅色櫻桃味
 諮詢專線：(02)2655-8680