




“南光” 可多普洛菲肌肉注射液 25毫克/毫升

Ketoprofen I.M. Injection 25 mg/ml "N.K."

本劑的主成分Ketoprofen為2(-3-Benzoyl-Phenyl) Propionic acid 是一種白色結晶性粉末，不溶於水，可溶於Benzene、95% Alcohol、Methanol、Acetone、Chloroform與Dimethylformamide。本劑具有和Ibuprofen相同的抗炎作用(Anti-inflammatory)，具有比Phenylbutazone 和 Mefenamic Acid更有效果的鎮痛作用 (Analgesic activity)，而有比 Indomethacin、Phenylbutazone和Mefenamic Acid強的解熱效果(Antipyretic activity)，尤其本劑對於呼吸、心臟及ANS均不起作用(Action)，排尿與 Na、K、Cl的排泄均不受影響，血液凝血素元時間(Prothrombin time)亦不受影響。



□ 成 分 : Each ml contains:

Ketoprofen 25mg

□ 賦形劑 : Dibasic Sodium Phosphate Dihydrate、Polyethylene Glycol 300、Benzyl Alcohol、pH調整劑、Water for Injection。

□ 藥理作用 : 本劑具有下列四種藥理作用:

(1)Stabilization of lysosomal membrane (block of the release of β -glucuronidase):

本劑可抑制 β -glucuronidase的釋出，而保持lysosome的正常。

(2)Prostaglandin synthesis inhibition: 本劑具有10~15倍的Indomethacin、800倍的Ibuprofen 及1000~1500倍的Aspirin，對於前列腺素(Prostaglandin)之合成抑制作用，因此有很強的解熱鎮痛效果。

(3)Antibradykinin activity: bradykinin 可引起bronchospasm，本劑可抑制之，其效果為Indomethacin之8倍，Phenylbutazone之100倍。

(4)Anti-platelet aggregation activity: 本劑具有抗血小板凝集作用，但與血液凝固時間沒有關係，故本劑可用於血栓症。

□ 適 應 症:

消炎、鎮痛、解熱（風濕性關節炎、強硬性脊椎炎、痛風、骨關節炎、腰酸背痛以及手術外傷後之疼痛）。

□ 用法用量: 本藥限由醫師使用。成人每次肌肉注射50mg~100mg，一日1~2次。

□ 注意事項：

一、一般的注意：

- 1.仔細觀察患者的狀態，留意其副作用。曾經出現過過度體溫下降、虛脫、四肢冰冷等症狀；但幼小兒，高齡者及消耗性疾患患者卻是伴著高熱。
- 2.因會掩飾感染症，故處理伴有感染的炎症時，應併用適當的抗細菌劑或抗真菌劑。
- 3.盡量避免併用其他的消炎鎮痛劑。
- 4.本品有引起氣喘或循環性崩潰(**Circulatory collapse**)之虞。

二、禁忌：

1.血液異常、肝障礙、腎障礙、心機能不全的患者。

2.對**Aspirin**曾經發生過過敏性氣喘的患者。

三、慎重投與

曾經發生過血液異常、肝障礙、腎障礙、心機能障礙、過敏症、支氣管氣喘的患者。

四、副作用：

休克、噁心、嘔吐、胸悶、**Lyell**症候群(中毒性表皮壞死症)、注射部位疼痛或硬結。

五、相互作用：

因與 **Neuquinone** 類抗菌劑，例如 **Ciprofloxacin Hydrochloride**，併用時會發生痙攣現象，故應避免兩者併用或應慎重投與。

□ 儲存：應於25°C以下避光儲存。

□ 包裝：注射液25毫克/毫升：2，3毫升安瓿，100支以下盒裝。

衛署藥製字第037252號

