

營 養 劑

“信東” 美達研 注射液 10%

Vitagen INJECTION 10%

【 組 成 】

Each ml contains:

Glucose, H₂O 100mg

本藥含賦形劑 Water for Injection。

【 適 應 症 】

營養補助劑。

【 用 法 】

1. 皮 下 注 射：將注射液注於大腿部皮下為佳。
2. 靜脈內注射：尤其是滲透療法及使用大量的糖分時以本法為便利。
本藥限由醫師使用。

【 注 意 】

1. 高張液行靜脈內注射時要在可能範圍內緩慢地施行，大量注射時將該液用溫水加溫後使用為宜。
2. 靜脈內注射時，因體質之不同，注射之後，有時可能誘發輕度的惡寒戰慄或發燒，這時使用強心劑，或令安靜即可。
3. 對於糖尿病重症患者，宜避免使用本劑為佳。

【 使用之注意事項 】

(一)取用時：

1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

1. 請依輸液套使用方法正確使用。
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(coring)產生碎片。
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【 包 裝 】

玻 璃 安 甌：20ml

玻 璃 瓶：500ml,1000ml

塑 膠 瓶：500ml,1000ml

塑 膠 軟 袋 裝：20ml,100ml,250ml,300ml,500ml,1000ml

內衛藥製字第 013141 號



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路22號

54220200 ⑤