



抗過敏症劑

PNT-004
衛署藥製字第004737號

“永信”

佩你安[®]

錠

Pilian[®]

Tablets "Yung Shin"

3.98cm



多年來臨床上常用單獨的抗組織胺劑來治療各種過敏症狀及搔癢症，但往往得不到預期的效果。經長時間多方面的探討，學者們注意到Serotonin（血清壓縮質）與Histamin（組織胺）同樣有引起過敏症的作用，換言之，即是：所有的過敏症狀可能由於Histamin的釋放而引起，亦可能由於Serotonin之游離而發生，組織中Histamin及Serotonin的釋放均足以引起各種過敏症狀及搔癢症。此一學說確立之後便可圓滿的解釋為什麼單獨的抗組織胺劑並不能完全治療各種過敏症狀及搔癢症了。

本藥之主成分Cyproheptadine Hydrochloride為至目前為止所有抗組織胺劑及抗血清壓縮質劑中效力強，治療效果確實的製劑，因其兼具抗組織胺及抗血清壓縮質之雙重作用，故一般單純之抗組織胺劑無法奏效之各種過敏症狀及搔癢症如改服本藥則可以得到確實的療效。本藥非Phenothiazine製劑，臨床上應用絕無震顫性麻痺現象(Parkinson's Disease)、無緊張性(Atonia)、白血球減少或黃疸等現象之發生，安全範圍極大之優良抗過敏性、止癢劑。

【成分】每錠中含：

Cyproheptadine Hydrochloride.....4mg

【賦形劑】

Lactose、Cellulose Microcrystalline、Calcium Carboxymethylcellulose、Sunset Yellow FCF、Magnesium Stearate、Sodium Lauryl Sulfate、Magnesium Aluminosilicate、Polyvinylpyrrolidone、Sodium Starch Glycolate。

【特徵】

1. 本藥兼具抗組織胺及抗血清壓縮質之雙重作用，效力強，治療效果確實，一般單純抗組織胺劑無法奏效之各種過敏症及搔癢症如改服本藥則可以得到預期的效果。
2. 一般支氣管性氣喘、季節性氣喘、內因性氣喘症施用普通氣喘治療劑無效時，可以服用本藥而得到卓越的效果。
3. 本藥偶有鎮靜、嗜眠現象，但此現象對於一般皮膚過敏、搔癢症的患者反而有良好的效果，可使患者皮膚的感覺遲鈍化，緩和情緒的緊張而減少搔癢感。

【適應症】

枯草熱、過敏性鼻炎、接觸性皮炎、皮膚炎、神經性皮炎、濕疹性皮膚炎、濕疹、蕁麻疹、藥物及血清過敏反應、血管神經性水腫、氣喘症、季節性氣喘、內因性氣喘。

【用法·用量】

通常成人每日3~4次服用之，每次1錠，2~6歲每次1/4錠，7~14歲每次1/2錠，一天3~4次使用。視病情、體重適宜增減之。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 一般注意事項：本藥有催眠作用，故服用期間應避免開車、或操作機械。
2. 本藥會增進食慾，故肥胖者投與應注意。
3. 青光眼患者，狹窄性胃潰瘍患者，幽門十二指腸閉塞患者，前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾病患者，支氣管喘息之急性發作患者，新生兒、未熟兒、高齡且衰弱之患者，及對本藥過敏既往例患者，禁忌使用本藥。
4. 支氣管性氣喘，既往例患者，高眼內壓患者、甲狀腺機能亢進患者、心血管障礙者、及高血壓患者，應慎重投與本藥。
5. 副作用：
 - 1) 過敏症若發生時，應中止投與。
 - 2) 精神神經系統：思睡、偶有倦怠感、及可能有頭痛、眩暈、刺痛感、興奮、錯亂等症狀。
 - 3) 消化道：口渴、噁心、下痢、腹痛等症狀。
 - 4) 血液：罕見紫斑、血小板減少、白血球減少等血液障礙，應小心觀察，若出現上述症狀時應中止投藥。
 - 5) 其它：可能出現頻尿、粘膜乾燥、浮腫現象。
6. 孕婦投與之安全性尚未確立，故孕婦及可能懷孕婦女宜衡量利弊，再行投與。
7. 授乳婦使用之安全性尚未確立，故授乳中婦女請勿投與。
8. 相互作用：與下列藥物併用，其作用會增強，故併用時應減量並慎重投與。如中樞神經抑制劑，MAO抑制劑，抗膽鹼作用劑，及酒精。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

6~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



YUNG SHIN[®]

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2141639

