

"生達"

## 美舒咳

(安布索)  
液 3 公絲 / 公撮

### MUSCO

Solution  
3mg/ml (Ambroxol)  
"STANDARD"

本品為目前臨床上使用最為廣泛的祛痰劑。它具有促進黏液排除作用與溶解分泌物的特性，因此能促使呼吸道內黏稠的分泌物之排除。本品也具有刺激支氣管—肺系統內界面活性劑的形成與分泌，因而增進黏液纖毛運送機轉之效力，故可以很有效地幫助黏液的排除，而維持呼吸道之通暢。此外，美舒咳也可以在呼吸道黏膜上形成一層薄膜，而執行它正常的保護功能。由於本品效果迅速確實，耐受性佳，可長期服用，誠為一理想優異之祛痰劑。

**成份：**每ml含Ambroxol hydrochloride…………… 3mg

- 作用特點：**
- 1.具有獨特的作用機轉：刺激界面活性劑的形成與分泌。
  - 2.作用範圍廣：由肺泡（無纖毛區）到氣管皆可作用。
  - 3.胃腸吸收良好：效果迅速確實。
  - 4.持續作用時間長達9~10小時。
  - 5.口服投與72小時後，可完全由尿中排除。

**適應症：**祛痰。

**用法用量：**本藥須由醫師處方使用。

成人及10歲以上的小孩：每天3次，每次10ml。

5~10歲的小孩：每天3次，每次5ml。

2~5歲的小孩：每天3次，每次2.5ml。

2歲以下的小孩：每天2次，每次2.5ml。

長期治療時劑量可減少。

小孩的推薦劑量為按體重每天每公斤服用1.2~1.6mg。

**禁忌症：**尙未知。

**警語及注意事項：**

- 1.懷孕時：誠如任何製劑，於懷孕的前三個月並不推薦服用。
- 2.交互作用：Musco可與其他藥物併用，尤其可與皮質類固醇、抗生素及支氣管擴張劑等藥物併用。
- 3.過量：目前在人類尙無過量的症狀被報導。如果發生時應使用對症療法。
- 4.有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑（erythema multiforme）、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症（Stevens-Johnson syndrome <SJS> / toxic epidermal necrolysis <TEN>）、急性廣泛性發疹性膿胞症（acute generalised exanthematous pustulosis <AGEP>）等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含 ambroxol或bromhexine成分藥品有時間關

聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀（如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛）。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

不良反應：

免疫系統疾患：

罕見：過敏反應（hypersensitivity reactions）

頻率未知：過敏性反應（anaphylactic reactions）（包括：  
：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症）

皮膚及皮下組織疾患：

罕見：皮疹、蕁麻疹

頻率未知：嚴重皮膚不良反應（包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿胞症）

副作用：Musco通常有很好的耐受性，只有少數患者有輕微的胃腸不適及過敏反應。

賦形劑：Sodium Citrate、Citric Acid Anhydrous、Sodium Benzoate、Sucrose、Aspartame、Glycerin、Sorbitol Solution 70%、Melon Essence、Tartrazine、Food Color Blue No.1、Water Purified

貯存條件：25°C 以下儲存。

包裝：60~4000公撮塑膠瓶裝。

衛署藥製字第041236號



PIC/S GMP藥廠  
生達化學製藥股份有限公司二廠  
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.  
台南市新營區開元路154號

3214280 20180601