

衛署藥製字第 012051 號  
衛署藥製字第 024132 號

中國化學

**安蒙西林膠囊** 250 毫克  
500 毫克

**Amoxicillin Capsules** 250mg  
500mg

C.C.P.

網號：B21  
B32

Amoxicillin 為半合成的抗生素，安全又具廣效的殺菌作用，為較 Ampicillin 更進步的 Penicillin 同類物。

**成分：**

每膠囊含有：Amoxicillin Trihydrate  
eq. to Amoxicillin 250mg, 500mg(Potency)

**優點：**

胃酸中安定，所以無須配合進食時間。除了腦部和脊髓液，它都能分佈到大多數的組織與體液。約 60% 在六小時內以原形由尿排出，在血清中有 20% 為蛋白結合態，若同時服用 Probenecid 可延緩其排泄。

**適應症：**

葡萄球菌，鏈球菌，肺炎雙球菌，腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

**效能與用法：**

	病原菌種	適應症	用法
上呼吸道感染症	由 Streptococci, Pneumococci, Nonpenicillinase producing Staphylococci, H. influenzae 引起者	中耳炎，鼻竇炎，咽喉炎，扁桃腺炎。	成人： 250mg-500mg 每 8 小時一次 小孩： 20mg-40mg/ 公斤/日， 每 8 小時一次 若小孩體重 達 20 公斤以上， 則依成人劑量投藥。
生殖泌尿道感染症	由 E. coli, Proteus mirabilis, Streptococcus faecalis 引起者	膀胱炎，腎盂炎，尿道炎。	
皮膚及軟部組織感染症	由 Streptococci, Staphylococci, E. coli 引起者。	癰疽疔瘡，蜂窩狀組織炎，外傷，骨髓炎，心內膜炎，膽囊炎。	症狀消除後，仍宜繼續治療 2-3 天。

	病原菌種	適應症	用法
下呼吸道感染症	由 Streptococci, Pneumococci, H. influenzae, 引起者	急慢性支氣管炎，肺炎。	成人：500mg 每 8 小時一次 小孩：40mg / 公斤/日，每 8 小時一次 若小孩體重達 20 公斤以上則依成人劑量投藥。
淋病與急性無併發症之泌尿系感染症	由 N. gonorrhoeae 引起者 (男女性皆同)	淋病。	成人：3gm 作單一口服劑量使用，疑有梅毒之淋病患者，須作 Darkfield 檢查，治療後應至少四次按月作血清試驗。

**禁忌：**對盤尼西林曾有過敏反應者不宜使用。

**注意事項：**長期治療使用時，須定期作肝臟、腎臟和造血機能檢查。治療期間若復感染黴菌性或細菌性病原時，須適時停藥，再建立新的治療體系。本藥須由醫師處方使用。

**副作用：**除了對青黴素過敏者外無嚴重的副作用，若有胃腸不適發生，亦極輕微罕見。

**貯存：**室溫、遮光貯存。

**包裝：**

250mg 6~1000 粒膠囊瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

500mg 6~1000 粒膠囊瓶裝/盒裝。

**賦形劑：**

**250mg：** Magnesium stearate, Talc  
硬膠囊：Gelatin, Titanium Dioxide, New Coccine, Sunset Yellow FCF, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerine

**500mg：** Magnesium stearate, Talc  
硬膠囊：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Sunset Yellow FCF, New Coccine



**中國化學製藥股份有限公司**

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL: (02)23124200

台中工廠：台中市工業區 15 路 10 號

