

“五福” 非尼乙非林點眼液 10%

(鹽酸去甲腎麻黃鹼)

衛署藥製字第 030859號
G-0975

"Wu Fu" Phenylephrine Hydrochloride Ophthalmic Solution. 10%

血管收縮、散瞳劑

說明：Phenylephrine HCl係類似Epinephrine與Ephedrine合成的交感神經刺激劑。此藥物在眼科領域乃是利用它作血管收縮作用及散瞳作用。

成份：每ml中含有

Phenylephrine Hydrochloride.....100mg
Chlorobutanol, Sodium Citrate, Citric acid, Boric acid, Edetate disodium,
Sodium bisulfite, Purified water.

適應症：眼科手術或檢查前去充血及散瞳。

用法、用量：本劑須由醫師處方使用

- 1.作為散瞳及血管收縮劑時，每一眼點一滴本品，並可合併使用一滴局部麻醉劑（如0.5% tetracaine HCl）。
- 2.本品在眼科手術使用，應在手術前30~60分鐘使用。

藥效、藥理：健康成人對於本劑散瞳迅速，點眼後通常經過5~6小時即恢復正常。

使用上注意：

1. 一般注意：

- (1)隅角之診斷在未確定前，請勿使用本劑。
- (2)採用Cyclopropane, Halothane等全身麻醉前，停止使用本劑。

2. 下列病患停止使用：

狹隅角或前房狹窄，有眼壓上昇因素之病患（疑可能引起併發急性閉塞青光眼之症狀）。

3. 下列病患應謹慎使用：

- (1)小兒（易引起全身副作用）
- (2)高血壓症之病患
- (3)動脈硬化症之病患。
- (4)冠狀不全或心臟不全之心臟症患者
- (5)糖尿病或甲狀腺機能亢進症之病患。

4. 副作用：（如有出現全身症狀時即停止使用）

- (1)眼：有時候引起眼壓上昇之症狀。
- (2)循環系統：有時候引起血壓上昇等症狀。

5. 相互作用：在使用MAO抑制劑治療中或者治療後3週以內之患者，及使用三環系抑鬱劑治療中的患者，惟恐引起急劇之血壓上昇，須慎重投與。

6. 點眼適用之方法：點眼之時，原則上以病患橫臥姿勢為宜，將患眼開瞼，本劑點滴於結膜囊內，使閉瞼1~5分鐘，壓住淚囊後開瞼。

7. 本劑性狀為無菌水溶液如有沈澱時不可使用。

8. 為防止主成份之分解，容器只容許玻璃或塑膠製品，不可使用金屬容器。

9. 貯存時請避光，於25°C以下保存，使用後請密栓，放置於孩童取不到之所在。

10.局部麻醉劑中硫酸Butacaine和本劑中之Chloride配合時，會引起沉澱，故禁忌配合。

包裝：100ml以下塑膠瓶裝，100支以下盒裝。



五福化學製藥股份有限公司
WU FU LABORATORIES CO., LTD.
宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區德興八路九號