

"培力"
保理寧 陰道栓劑
Polinin Vaginal Suppositories "P.L."

【成分】1粒栓劑含量：Policresulen 90mg

【賦形劑】Lecithin, Paraffin Wax, Hard Fat, Colloidal Silicon Dioxide, Sodium Hydroxide

【適應症】子宮頸糜爛、子宮頸炎(含由毛滴蟲及念珠菌引起者)、陰道炎、白帶。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

婦科：每二日使用一粒本品陰道栓劑。

在燒灼術治療間隔中，如果使用policresulen濃縮液，則陰道栓劑須每二日使用一粒。為加快給藥，可先以水潤濕栓劑，病人最好以仰臥姿勢，使藥物能深入陰道中。

在夜間實行陰道給藥最適當，最好使用清潔的毛巾，可避免衣服和床單被沾污。

【配合禁忌】在懷孕期間，本品給藥應考慮其對母親及胎兒之絕對必要性時才可給藥。動物實驗並未有任何畸胎報告顯示。研究至目前尚無法說明懷孕婦女給藥的危險性，尚且不知是否主成分會排除於授乳婦的乳汁內。

【副作用】在以本品治療初期會有局部刺激作用，但通常迅速地消退。

【藥物交互作用】本品僅能局部使用，在治療期間不可使用其他的局部作用製劑於相同部位，以避免藥物交互作用。

【特別注意事項】

1. 本品栓劑會在治療過程中產生刺激作用。如果壞死組織由病灶區脫落，即使是大量時，無需驚恐。
2. 在治療期時不可用刺激性肥皂清洗或性交。
3. 與其他陰道製劑一樣，本品栓劑在月經來時不可使用。
4. 本品栓劑應避免眼部接觸。
5. 如有棉織物及皮革與本品栓劑接觸後，必須在製劑未乾前立即清洗乾淨。
6. 陰道栓劑上的斑點，是栓劑基劑產生的自然現象，不影響其使用，效果或耐受性。

【注意】應注意藥品的有效期限，本品過期即不可使用。

【儲存】應保存於不超過25°C的室溫中。應置放於兒童拿不到之處。

【包裝】100粒以下塑膠盒裝。



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576(代表號)

傳真：04-23590992

POS-D_03