

Clomiphene Clomiphene Clomi

“優生” 可洛米分 膠囊50公絲
Clomiphene Capsules 50mg "Y.S."

衛署藥製字第15849號
LT-093-CI

【主要成分】：每粒含量

Clomiphene Citrate50mg

【特點】：

1. 藥效自然，恢復人體自然的排卵和受孕機能，此藥並非體外荷爾蒙劑之刺激作用。
2. 本品非類固醇藥物。
3. 使用方便：本品為口服受胎劑，每月只需服五次，使用上非常方便。

【適應症】：

促進排卵。

【注意】：

1. 動物實驗時會有胎兒毒性和致畸胎性的現象，對人類妊卵之安全性尚未確立，故妊娠之婦女絕對不可給藥。
2. 為避免妊娠初期的不注意而誤服請注意下列各點：
 - (1) 在投藥前至少一個月及治療期間中必須記錄基礎體溫，以便觀察有無誘排卵。
 - (2) 對於無月經患者在投與前做 gestagen test 消退性出血開始日視為第一日之第五日，又投與前反然出血(無排卵週期症)者其第五天開始給藥。
 - (3) 投藥後基礎體溫移往高溫層時停藥，並確認有無妊娠。
3. 本療法之對象僅為間腦或腦下垂體前葉之機能障礙所致之性腺刺激荷爾蒙低分泌無排卵巢患者，因此下述患者不可投與。
 - (1) 原發性卵巢不全所引起之尿中性腺刺激荷爾蒙分泌過高時。
 - (2) 副腎及甲狀腺機能異常所致之無排卵患者。
 - (3) 頭蓋內病變(腦下垂體腫瘍)之患者。
 - (4) 無排卵症以外的不孕症患者。
- (5) 為避免對卵巢過度刺激所引起之副作用在給藥前及治療期間應每天內診特別留意，以下各點如認為異常應即停藥：
 - ① 患者有無自覺症(特別是下腹部痛)。
 - ② 卵巢有無腫大。
 - ③ 基礎體溫有無異常上升(每日測定)。

④頸宮粘液及其性狀。

⑤給藥量與卵巢過剩刺激有相互關係，故用量為一日100mg五天為一週期。

⑥卵巢過剩刺激有多胎妊娠的可能性，故需將此情況預先告知患者。

⑦無月經患者需於投與前以 Gestagen Test 確認第一度無月經以 estrogen Test 確認子宮性無月經。

⑧一段在反覆投與三療程後尚未排卵之患者停止服用。

⑨須在婦產科、內分泌專門醫師監視下使用。

4. 卵巢腫瘍及多胞性卵巢症候群無關之卵巢腫大患者，請勿服用。

5. 肝障害及肝疾患之病患禁服。

6. 下列患者原則上不要給藥，如非得已必須要給藥時，請慎重投與，如沒有得子希望的無排卵患者。

7. 慎重投與：

(1) 有肝疾患，肝障害之既往歷者。

(2) 多胞性卵巢患者。

8. 副作用：

(1) 卵巢過剩刺激：下腹部疼痛等卵巢腫大症狀出現，即中止服藥。

(2) 眼：霧視等之視覺症狀出現即中止服藥，並至眼科檢查。

(3) 過敏症：發疹等過敏症之出現時中止服藥。

(4) 肝臟：5%以上患者有BSP排泄遲延現象。

(5) 胃腸：有時會有噁心、嘔吐、食慾不振等現象。

(6) 精神神經系：偶有頭痛、情緒不安等現象。

(7) 其他：偶有顏面潮紅、尿量增加、口渴、疲勞感等現象。

9. 其他：霧視等視覺症狀出現時如從事開車機械操作等事項時請特加注意。

【用法用量】：

以二個月治療期為限（即分二個月）每個治療期中連續服五天，其投與方法分述如下：

(1) 第一治療期：自月經來潮後第五天開始服藥，每次服一粒，一天一次，連服五天。

(2) 第二治療期：第一次服藥後如未達到排卵的目的，應於下次月經來潮後第五天開始服藥每天二粒（為第一治療期的加倍量）連服五天。本藥須由醫師處方使用。

【賦形劑】：

Starch Anhydrous, Magnesium Stearate, Capsule Shell (Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide, Tartrazine)

【包裝】：

瓶裝：100caps 200caps 1000caps

盒裝：10caps 100caps



優生製藥廠股份有限公司

台中市南屯區工業區21路14號

MM 201512