

速妥善 靜脈凍晶注射劑 3 毫克

SOMATOSAN® 3mg “Curamed” for I.V. Infusion

衛署藥輸字第 021191 號

主成份： Somatostatin acetate

成份：

每安瓿有 3.19~3.85 毫克乾燥物質；其中含有藥物活性成份 Somatostatin acetate 3.19~3.85 毫克，相當於 3 毫克之 Somatostatin。

賦形劑： Sodium hydroxide or hydrochloric acid

適應症：

食道靜脈曲張引起的嚴重急性出血，嚴重性急性消化性潰瘍出血，於急性之糜爛或出血性胃炎之急性嚴重出血，胰臟手術後胰臟併發症之預防。

禁忌：

懷孕，生產及產後期、哺乳期。
大量動脈出血而必須以外科手術治療者。

副作用：

治療初期，本品可能導致血糖降低。胰島素依賴性糖尿病患所使用的胰島素治療劑量若未因服用此藥而作調整（其為控制血糖作用），則該病患會有血糖過低的現象（低血糖症）。然而，這種現象只是暫時性的，由於本品具有抑制胰島素分泌的作用，2~3 小時後血糖又會升高（高血糖）。因此，應該每隔 3~4 小時監控血糖值。儘可能避免同時使用需要胰島素代謝的醣類，如果有必要的話，可以使用少量的胰島素。

特別注意事項：

應該避免重複治療，因為可能產生過敏現象的危險性。

藥物交互作用：

本品會延長服用 barbiturates 後的睡眠時間並會增強 pentetrazol 的藥效。因此，應該在這類藥物的藥效減退後再服用本品。本品為一乾燥性物質，不得與葡萄糖或果糖溶劑混和使用。

用法用量：本藥限由醫師使用

本品溶解於等張、無菌、無熱原的生理食鹽水中，用於靜脈點滴輸注；每小時每公斤的體重得注射本品 3.5µg 之劑量。

如：某一病患體重 75 公斤，注射本品時間為 12 小時，使用注射器注射本品時，先使其溶解於 36ml 之等張、無菌、無熱原的生理食鹽水中，然後注入 50ml 容量之注射針筒中，可調整注射器的注射率為每小時 3ml。

如有必要，在開始輸治療程時，可先投予單一 3.5µg/kg 本品劑量。例如體重為 75 公斤的病患，可將注射速度調整為 1 分鐘先輸注 3 毫升。

注射時間：

一般而言，注射時間不超過 5 天。
注射溶劑應在即將注射前立即調配。
有效期限一到，便不得使用本品。
置放於孩童拿不到的地方！

特性：

本品會抑制胃酸、胃蛋白酶及胃泌素的分泌，並降低內臟血液流動的速率。

同時，本品還會抑制胰液、小腸內泌素、膽囊收縮素、motilin、vasoactive intestinal peptide(VIP)、胰島素、昇糖素、胰多胜、pancreatic polypeptide、生長激素及甲狀腺刺激素的分泌。

包裝：

原裝為一安瓿含 3.19~3.85mg 之乾燥有效物質。

製造廠名： BAG Health Care GmbH

製造廠址： Amtsgerichtsstraße 1-5, D-35423 Lich, Germany

包裝廠名： Biokanol Pharma GmbH

包裝廠址： Kehler Street 7, 76437 Rastatt, Germany

License Owner：

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Iceland.



藥商：海喬國際股份有限公司

地址：台北市重慶北路三段 276 號 9 樓

電話：(02)25873566(20 線)、(02)25970138(10 線)

FAX：(02)25953956(3 線)、(02)25952789(3 線)