



"瑞士"

安心平 注射液2毫克/毫升(樂必寧)

Anxicam Injection 2mg/ml "swiss" (**Lorazepam**)

本品屬Benzodiazepaine類藥物，且是同類藥物中，使用劑量最低就能產生鎮靜、解除焦慮的藥效。本品用於手術前給藥，對大多數患者會產生暫時性、可逆健忘反應，使患者難想起近手術的事情，以緩解手術前焦慮。

【成分】

Each ml contains :

Lorazepam.....2 mg

【賦形劑】

P.E.G.400、Benzyl Alcohol、N,N-Dimethyl Acetamide、Propylene Glycol

【適應症】

焦慮狀態。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

1. IM時：常用劑量是0.05 mg/kg,最大劑量為4 mg。在手術前2小時給藥。
2. IV時：常用劑量是0.02 mg/lb(0.044 mg/Kg)或總量2 mg。在手術前15-20分鐘給藥。大部份用於成人病患，但通常不含50歲以上者。
3. IM注射時：不經稀釋直接行深部肌肉注射。
4. IV注射時：用等體積的生理食鹽水或注射用水稀釋。IV給藥須緩慢，限1分鐘2 mg以下的速率。
5. 18歲以下的孩童：劑量未確定。

【警語及注意事項】

1. 併用opioid類藥品：Benzodiazepine類藥品與opioid類藥品併用，可能導致重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。
2. 下列患者禁用：對Benzodiazepaine過敏。急性狹角性青光眼、急性酒精中毒、昏迷、休克、懷孕、授乳婦。

3. 副作用：
 - a.神經系統-嗜眠、頭疼、眩暈、耳鳴、視覺模糊。
 - b.循環系統-低血壓。
 - c.皮膚-搔癢發疹。
4. 50歲以上的病人，IV時會有更長、更深的鎮靜作用，通常起始劑量不能超過2 mg。
5. IV時需重複抽吸以確定藥物進入靜脈中，若意外的動脈內注射可能產生動脈痙攣、壞死。
6. 服用本品可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。
7. 依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【儲存條件】

置於冰箱冷藏 2~8°C，避光儲存。

【包裝】

1 毫升玻璃安瓿裝、1 毫升玻璃小瓶裝、10 毫升玻璃小瓶裝，100 支以下盒裝。

用藥指示：

1. 產品使用時請依照先進先出，避免不當儲藏影響藥品品質。
2. 為維護民眾用藥安全與醫療院所購藥權益，使用時如發現藥液有變黃或沉澱之現象，請聯絡經銷商更換新品。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號