

營 養 劑

# 美 達 研 注射液 50%

## Vitagen INJECTION 50%

### 【組 成】

Each ml contains:

Glucose ..... 500mg

本藥含賦形劑Water for Injection。

### 【適 應 症】

營養補給。

### 【用 法】

- 1.皮 下 注 射：將注射液注於大腿部皮下為佳。
- 2.靜脈內注射：尤其是滲透療法及使用大量的糖分時以本法為便利。  
本藥限由醫師使用。

### 【注 意】

- 1.高張液行靜脈內注射時要在可能範圍內緩慢地施行，大量注射時將該液用溫水加溫後使用為宜。
- 2.靜脈內注射時，因體質之不同，注射之後，有時可能誘發輕度的惡寒戰慄或發燒，這時使用強心劑，或令安靜即可。
- 3.對於糖尿病重症患者，宜避免使用本劑為佳。

### 【使用之注意事項】

(一)取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(coring)產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

### 【包 裝】

玻璃瓶：150毫升，300毫升，500毫升

玻璃安瓿：20毫升

塑膠安瓿：20毫升

塑膠瓶：500毫升，1000毫升

內衛藥製字第006067號



信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路 22 號

54220190 ⑦