

130.00 mm

安適胃寧液 1毫克/毫升  
Aswell Solution 1mg/ml

GMP  
衛署藥製字第 043730 號  
G-7073

使用含metoclopramide成分藥品可能造成遲發性運動障礙(tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，且分析本品之使用型態，約20%病人使用超過12周，故不建議長期(超過12周)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生tardive dyskinesia之風險者。

主成份：每毫升(ml)含有  
Metoclopramide (hydrochloride).....1.0 mg

適應症：  
預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

1.緩解胃與食道之回流：

每日四次，飯前及睡前30分鐘服用10~15毫升，如症狀是間歇性或在某特定時間發生，則藥量一次可提高至20毫升，並在狀況發生前服用，可不必連續服藥。

2.若對本藥有過敏者，可減少至每次5毫升。

3.治療食道糜爛和潰瘍者的臨床經驗不多，故治療週期建議不要超過12週。

4.糖尿病人胃蠕動不良的緩解，每餐飯前及睡前30分鐘，服用10毫升，共2~8週。

藥理作用：

Metoclopramide能刺激上胃腸道的蠕動，而不致刺激到胃、膽、胰的分泌，它主要為增加乙酰膽鹼的敏感度，進而增加胃收縮的強度及幅度，放鬆幽門括約肌和十二指腸球，增加十二指腸的蠕動和空腸，使造成加速胃的出空及腸的通暢，也可以增加下食道括約肌的收縮強度，但對結腸及膽囊的刺激影響是很小的，給病人5~20毫升的Metoclopramide即可使下食道的括約肌壓力增大。

禁忌症：

若增加腸胃蠕動會造成傷害者，如已患腸胃出血、阻塞或穿孔者，則不適合服用本劑，此藥亦不可用於親鉻細胞瘤病人，因為可能會因瘤放出Catecholamines而造成高血壓危機。此藥也禁用於對此藥過敏及無耐受性的病人。Metoclopramide也不可用於癲癇病人。

注意事項：

1.Metoclopramide對胃腸蠕動的作用會被抗膽鹼激素(Anticholinergic)藥和麻醉藥拮抗，而當與鎮靜藥、酒精、安眠藥及麻醉藥合用時會發生鎮靜作用。

2.Metoclopramide對有高血壓的病人會因釋放茶酚胺，所以用藥時要多加小心。

3.Metoclopramide會使須經胃作吸收的藥的吸收減少(如digoxin等藥)，而使得在小腸吸收的藥之吸收速率及吸收量增加。(如Acetaminophen ,tetracycline,levodopa, ethanol, cyclosporine等藥)。

180.00 mm

4.服用Metoclopramide會加快食物輸送到腸及腸的吸收，使糖尿病患胰島素不及反應，造成血糖太低，故應注意胰島素用藥時間及藥量的控制。

**過 量：**

過量會產生思睡、缺失方向感、有錐體外反應，用抗巴金森氏症藥物或抗膽鹼激素(Anticholinergic)藥物可改善。早產兒及足月之初生兒，如口服1~4 ml/kg/day，會發生變性血紅素尿，可用IV注射Methylene Blue(甲烯藍)解毒。

**副 作 用：**

- 1.中樞神經的影響：偶有不安、倦睡、疲勞、乏力(疲憊)、失眠、頭痛、精神混亂、思睡等現象。
- 2.錐體外的反應—急性的Dystonia反應，包括肢體不自主顫抖、顏面攣縮、斜頸、眼球震顫等副作用及巴金森氏症狀的出現。
- 3.內分泌不正常：包括乳漏、停經、男性女乳化。
- 4.心血管症狀：包括低血壓、高血壓、心跳徐緩等。
- 5.腸胃方面反應：噁心、腸攪動、腹瀉等。
- 6.腎：尿頻及不適感。

**警 語：**

- 1.造成抑鬱。
- 2.成人每天服用30~40 毫升，少數會有錐體外症狀，如手指震顫、肌僵直、斜頸及顏面攣縮症狀。
- 3.有巴金森氏症的病人用藥要特別小心，因會有加重惡化的可能。
- 4.此藥會影響精神及生理，故服藥後不宜操作重機械或開車。
- 5.本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。
- 6.授予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用metoclopramide藥品相關的不良反應如肌張力失調(dystonias)及錐體外路徑反應(extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

賦形劑：Propylparaben, Glycerin, D-Sorbitol solution (70%), Saccharin Sodium, Aspartame, Methylparaben, Citric Acid Anhydrous, Tartrazine, Lemon Essence, Water Purified

包 裝：40~4000毫升塑膠瓶裝

**儲 存：**

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，請勿冰存。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

**CENTER LABORATORIES INC.**

地 址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-034 20150728

14A09-D01