



“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

# 艾克樂芙 乳膏50 毫克/公克(艾賽可威)

## ACLOVIR Cream 50mg/gm “*Sinphar*” (Acyclovir)

— Antiviral Agent —

本品主成份為 Acyclovir，可干擾疱疹病毒DNA的複製和增長，但正常細胞的DNA則不受影響，因此本品毒性極低，不易產生耐受性，且刺激性很少，是治療帶狀疱疹病毒，單純疱疹病毒感染之製劑。

成分:每gm含

Acyclovir.....50mg

其他成分:

Propylene Glycol、Cetyl Stearyl Alcohol、White Petrolatum、Liquid Petrolatum、Sorbitan Monostearate、Polysorbate 60、Sodium Bisulfite、E.D.T.A-2Na、Water Purified.

適應症:由單純疱疹引起之感染。

用法用量:成人及兒童：每天塗於患部5次(約隔4小時1次)連續使用5天，如未痊癒，則可連續使用10天。

注意事項及警告:

在體內及體外所做廣泛之基因突變試驗結果指出 Acyclovir 對人類沒有遺傳基因之危險。更進一步之動物試驗指出 Acyclovir 無致畸胎性及致癌性，對生育力也無影響。沒有資料指出使用艾克樂芙乳膏劑對懷孕婦女及胎兒之影響，也無資料指出，使用本藥後乳汁中Acyclovir之濃度。Acyclovir對其他任何藥品，未知有交互作用。

副作用:

使用艾克樂芙乳膏劑後，可能發生短暫之灼熱感或刺痛，有小部份之病患曾有紅斑或輕微乾燥、皮膚剝落之報告。

過量：

500mg Acyclovir如經口服後也不會發生不利之作用，志願者服用單劑量之 600mg Acyclovir 及一天量高達3600mg也無副作用發生，一次由靜脈注射80mg/kg之劑量也無副作用發生。

Acyclovir具可透析性。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第035391號  
G-3035號

儲藏：25°C以下保存。

包裝:1000公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號  
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com