

衛署藥製字第 033224 號

中國化學
迪心贊錠 30 公絲(鹽酸迪太贊)

Diltisser Tablets 30mg "C.C.P."

(Diltiazem HCl)

網號：C38

【成分名(中文名)】Diltiazem HCl (鹽酸迪太贊)

【劑型、含量】

成份：Each Tablet contains：Diltiazem HCl.....30mg

【臨床藥理】

1. Diltiazem HCl 是一種鈣離子拮抗劑，其藥理特性相似於 Nifedipine，主要作用為抑制心臟血管系統細胞外鈣離子的注入，擴張血管，增加冠狀血流量（但並不改變血液中鈣離子濃度），同時抑制心肌及血管平滑肌的收縮，擴張冠狀血管末梢血管，降低血壓減少心臟負荷。

2. 吸收、分佈、代謝：口服本藥之生體可用率(比較注射而言)為40%。本藥大部份經由肝臟代謝，有2~4%以未改變之形式經由尿排泄。本藥有70~80%會和血漿蛋白結合。口服本藥30~120mg後，30~60分鐘內可在血漿中測得，而在2~3小時內可得最高血中濃度。本藥口服單一或多次劑量其血中半衰期約為3.5小時。本藥代謝物 desacetyl diltiazem 大約佔有10~20%，其冠狀動脈擴張之強度約為 Diltiazem 的25~50%。本藥之治療血中濃度範圍為50~200ng/ml。尚無資料顯示本藥之排泄或代謝物會對肝或腎有損傷。

【適應症】狹心症；輕度至中度之本態性高血壓。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

1. 狹心症：通常成人1次30mg，1日服用3次。症狀較重時，可增量至1次60mg，1日服用3次。
2. 輕度至中度之本態性高血壓：通常成人1次30mg~60mg，1日服用3次。又，依年齡、症狀適宜增減用量。(參考)[日本藥局方第11版所載極量：Diltiazem HCL 1次90mg。1日360mg(口服)]

【注意事項】

1. 本藥由腎臟及膽汁排泄，故若長期使用或腎、肝功能不全之患者，使用本藥時應隨時監視之。

2. 懷孕婦女：懷孕或可能懷孕婦女使用本藥之安全性尚未建立。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：C

3. 哺乳婦女：哺乳婦女使用本藥之安全性尚未建立。

4. 幼兒：幼兒使用本藥之安全性尚未建立。

5. 使用上注意：

心傳導：本藥延長房室結之傳導，但除非病患有竇房結疾患，否則並不緩慢竇房結之跳搏。

心臟衰竭：本藥雖有降低心肌力，但對正常心室並無影響。臨床上若使用於心室受損患者，則避免使用，尤應避免與β-阻斷劑併用，本藥使用於此類病患時亦應避免劇烈運動。

低血壓：併用其他降血壓劑時應注意。

急性肝受損：此類作用少見。

6. 本藥並不能阻止急性狹心症發作。

【相互作用】β-阻斷劑及毛地黃與本藥併用會相互增加作用。

【副作用】

1. 時有水腫(2.4%)、頭痛(2.1%)、噁心(1.9%)、眩暈(1.5%)、發疹(1.3%)、無力感(1.2%)、房室阻斷(1.1%)。

2. 少有(少於1%)

心血管系統：顏面潮紅、心律不整、低血壓、心跳緩慢、心悸、心臟衰竭、暈厥。

神經系統：感覺異常、神經過敏、嗜睡、顫抖、失眠、幻覺、健忘。

胃腸系統：便秘、消化不良、腹瀉、嘔吐、鹼性磷酸鹽、SGOT、SGPT、LDH等的中度提高。

皮膚：搔癢、紫斑、蕁麻疹、對光敏感。

其他：多尿、夜尿。

【儲存條件】

本藥應儲存於冷暗乾燥處，避免光熱照射。

【包裝】6~1000錠瓶裝，盒裝。

賦形劑：

Lactose

Hydrogenated oil

PEG 4000

Ethyl cellulose 10 cps

Hydroxypropyl cellulose

Magnesium stearate



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路23號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口182-1號 ©