

滿克特 300 毫克腸溶膜衣錠

Metalcaptase 300mg

衛署藥輸字第 017283 號

- 成分： 每錠含 penicillamine (D-penicillamine) 300mg
- 賦形劑： Calcium hydrogen phosphate dihydrate、Cellulose, powdered、Cellulose microcrystalline、Copovidone、Castor oil, hydrogenated、Corn starch、Highly disperse silicon dioxide、Calcium behenate、Talc、Titanium dioxide、Macrogol 6000、Poly(methacrylic acid-co-methylmethacrylate) (1:1)、Triacetin、Methacrylic acid-ethylacrylate-copolymer (1:1)、Polysorbate 80、Dimeticon。
- 臨床資料： 接受 Metalcaptase 數年或數月的長期治療，有助於症狀的緩解，但數星期的服用，對類風濕關節炎症狀的改善並不明顯。當進行重金屬中毒的治療時，若確認相關檢驗值已回復到正常時，該治療即應中止。
D-penicillamine 分子的三個官能基，可以說明該藥物的複雜作用機轉，它會干擾間葉組織的代謝與免疫系統，並經由螯合作用與重金屬離子結合以及還原 SH 基。
- 適應症： 類風濕關節炎；重金屬中毒。
- 用法用量： 本藥須由醫師處方使用。
服用與停藥必需依醫師處方與醫師之監督下執行，一旦臨床治療已得改善，劑量可以減至維持劑量。
每日每次服用的劑量應相同、並於飯前 30 分鐘至一小時服用。除非是醫師處方，否則服用劑量應為：
成人：
類風濕關節炎
起始劑量是 Metalcaptase 300mg 1 錠，每二或四星期的間隔就增加一錠，直至每日 600mg 的劑量，若每日使用 600mg 治療八週後尚無令人滿意的臨床症狀改善時，則劑量可以同樣間隔時間增加，直達 1.8g 的最大限量。當效果發生時，劑量就要減到依個別病例而定的維持劑量，一般是每日服 300 至 600mg。急性和慢性重金屬中毒，每日 900mg 至 1.8g，劑量依中毒的嚴重性而定。
小孩：
類風濕關節炎
治療開始劑量為每日每公斤體重使用 D-Penicillamine 5mg，接著每隔 14 日一劑量增加 150-300mg，直到每日每公斤體重為 15-20mg 止。若有需要劑量可增加至每
公斤體重 30mg，當治療效果產生時便可改為維持劑量，一般每日每公斤體重服用 5-10mg。
- 禁忌： 嚴重造血系統機能異常，嚴重的腎衰竭，盤尼西林藥物過敏，紅斑性狼瘡。
- 副作用： 治療期間，偶而會出現如下的副作用：
- 皮膚反應 (蕁麻疹或是有 (無) 發熱性麻疹樣皮疹)，剝落性皮炎
- 服用高劑量的 D-Penicillamine，可能出現山梨豆中毒。
- 胃部不適，胃炎
- 味覺遲鈍
- 腎機能不全 (蛋白尿、腎病變)
- 血球目的改變 (白血球減少、血小板減少、貧血)
- 神經障礙 (運動神經障礙、視覺模糊以及知覺能力受損)
- 自動免疫系統反應 (紅斑性狼瘡、重症肌無力症、天庖瘡、多肌炎)
- 膽汁鬱滯
- 掉頭髮
- 過敏性齒槽炎或支氣管炎
- 乳房增大
高劑量的 D-Penicillamine 可能會影響到換者體內之 VitB6 值與礦物質的代謝。如果這二者的需求增加，使能降低 D-Penicillamine 的反應，因此建議採用併用 VitB6 與補充礦物質療法是需要。
- 注意事項： 用含金製劑治療期間使用 Metalcaptase 是不適宜的，除非是金的嚴重性副作用可被抵消。
Metalcaptase 不能與 Chloroquine 併用。
為了避免可能干擾胎兒的結締組織代謝，故懷孕時不宜使用 Metalcaptase。除非是以下症狀 (重金屬中毒)。
授乳期間禁止服用 Metalcaptase。
治療前期 2 個月，每一至二星期應作血液與尿液的監控，繼之每個月再檢驗一次。在使用 Metalcaptase 的治療前與治療間必需檢驗病患是否有精神異常、視覺模糊，同時應接受短期性的知覺、運動神經以及神經反射試驗。
- 包裝： 2-1000 粒以下鋁箔盒裝。
- 保存方式： 謹慎儲存，並遠離小孩觸手可及之處。

國外許可證持有者：Heyl Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG

地址：Kurfürstendamm 178-179, D-10707 Berlin, Germany

製造廠：Haupt Pharma Berlin GmbH

廠址：Moosrosenstr. 7, D-12347 Berlin, Germany

藥商：禾利行股份有限公司

地址：台北市敦化北路 311 號