

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝”可立舒乳膏0.5毫克/公克(可洛貝他索)	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字第	036315 號 G-3507 號



“杏輝”

cGMP 藥品

99. 9. 16

可立舒 乳膏0.5毫克/公克(可洛貝他索)

CLOBETASOL Cream 0.5mg/gm “Sinphar”

—— 消炎止癢劑 ——

Clobetasol propionate是外用合成皮質類固醇。有糖皮質固醇作用及輕微的礦物皮質固醇作用。在外用方面，Clobetasol具有抗發炎、止癢及血管收縮作用，因此可用於對類固醇有反應之各種皮膚疾病。

成份：每gm含：

Clobetasol propionate.....0.5mg

賦形劑：

Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edetate disodium、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified

適應症：

牛皮癬、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

用法用量：


早晚各一次，在患部塗敷一薄層。

禁忌：

- 對藥品中任何成份過敏、細菌性感染(如膿痂疹(impetigo)、疔、瘡、蜂窩組織炎)、念珠菌感染及皮膚症(dermatophytes infection)、單純性及帶狀疱疹。
- 眼用：使用於眼瞼或眼周圍皮膚，藥品可能會進入眼中，眼睛長期接觸類固醇，可能產生白內障或青光眼。

注意事項：

- 懷孕用藥級數：C級。
- 授乳期：目前尚不清楚外用皮質類固醇是否會有足夠的全身性吸收而使乳汁中達到可測得之濃度。全身性的皮質類固醇會分泌至乳汁中，但量尚不至對嬰兒造成破壞性影響。
- 全身性反應：外用皮質類固醇因全身性的吸收可能產生可逆性下視丘-腦下垂腺-腎上腺皮質軸的壓抑作用(HPA axis抑制)、庫興氏(Cushing's)症候群及高血糖、糖尿症狀。促使藥品全身性吸收的因素包括使用強效的藥品、大範圍塗抹、長期使用以及用敷布覆蓋做隔絕密封治療。若出現HPA axis抑制現象，應停藥或減少塗抹次數或改用效價較低的藥品。
- 兒童：Clobetasol不宜使用於12歲以下之兒童。兒童因其皮膚





8A, CHING SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
 傳真專線：(0800)015151 website: http://www.sinphar.com

Edetate disodium、Methyl paraben
 Propyl paraben、Water purified
 衛署藥製字第 036315 號
 G-3507 號

本藥須由醫師處方使用
 批 號：
 保存期限：



杏輝藥品工業股份有限公司
 SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路64號
 81, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
 傳真專線：(0800)015151 website: http://www.sinphar.com



※ 外文仿單應檢附中文譯文

產品名
衛生署

有限公司
-3507 號

99. 9. 16

表面積對體重的比例較高，故對外用皮質類固醇引起的HPA axis 抑制、庫興氏症候群及顱內高血壓可能較敏感。症狀包括生長遲緩、體重增加緩慢、血中cortisol值偏低、以及缺乏對ACTH刺激的反應；顱內高血壓症狀包括前門門鼓脹(bulging fontanelles)、頭痛及雙側視乳頭水腫(bilateral papilledema)。

HPA axis抑制一般於停藥後會立即恢復，偶而會有類固醇戒斷症狀發生，可能需要補充全身性的皮質類固醇。
*Clobetasol可能於每日2g的劑量下即會產生HPA axis壓抑的作用。
*一般而言，成人每星期使用50g，兒童15g的強效外用皮質類固醇(不以敷布覆蓋)會產生輕微的HPA axis壓抑效果。成人塗抹全身一次約需12-26g。

乾癬：外用皮質類固醇不宜當作擴散的斑狀乾癬(plaque psoriasis)中唯一治療，因為偶而在治療中或逐漸停藥時，反而會激發繼發性的乾癬。

萎縮：身體的某些部份，如臉部、關節及腋下較容易因使用皮質類固醇而發生萎縮現象。若這些部位必須接受治療，應經常觀察病人的反應。

*皮膚萎縮：使用強效的製劑3-4星期後可能產生皮膚萎縮現象，尤其是表皮吸收良好的部位。

*使用於眼窩旁或生殖器等處應小心。避免使用強效的皮質類固醇於臉部及對磨的(intertriginous)部位，因可能產生線紋。

感染：若發生感染，應接受抗感染藥治療，若症狀未能立即改善，則應停止皮質類固醇的治療直到感染得到良好的控制。以皮質類固醇治療皮膚的感染可能惡化感染的情形。

不宜用於治療酒渣鼻(rosacea)，口部周圍的皮膚炎或痤瘡(acne)。敷布覆蓋：若有感染現象，應停止使用敷布覆蓋，並接受抗感染藥的治療。

副作用：

- 局部：灼痛、瘙癢、紅疹、乾燥、毛囊炎(folliculitis)、多毛症(hypertrichosis)、粉刺狀疹、色素過低、口周圍皮膚炎、過敏性接觸皮膚炎、手指麻木感、皮膚剝落或龜裂、繼發性感染、皮膚萎縮、產生線紋、汗疹(miliaria)。若使用敷布覆蓋，這些症狀可能更常發生，偶而也會發生對某種敷布產生過敏的情形。
- 外用皮質類固醇可能有全身性的吸收，而產生可逆性下視丘-腦下垂-腎上腺皮質軸的壓抑作用、庫興氏症候群及高血壓、糖尿病症狀(參閱「注意事項」)。此現象較易發生於敷布覆蓋及使用強效藥劑的病人，兒童或肝衰竭的病人發生率也較高。
- 長期使用於面部周圍，可能產生白內障及青光眼。在萎縮皮膚附近，血管可能浮現於表皮，外圍部位可能有毛細管擴張(telangiectasia)及紫斑(purpura)現象。

儲存：室溫(15-30°C)下保存。

本藥須由醫師處方使用
衛署藥製字第036315號
G-3507號

包裝：1000gm以下鋁管、塑膠罐裝




Sinphar 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
服務專線：(0800)015151 website: http://www.sinphar.com

Edelate disodium, Methyl paraben
Propyl paraben, Water purified
衛署藥製字第 036315 號
G-3507 號

本藥須由醫師處方使用
批 號：
保存期限：

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
服務專線：(0800)015151 website: http://www.sinphar.com




※ 外文仿單應檢附中文譯文

產品名
衛生署

有限公司
-3507 號

99. 9. 16

<p>"Sinphar" 450gm Clobetasol Cream 0.5mg/gm - Anti-inflammatory & Anti-itch Agent -</p> <p>成分：每 gm 含 Clobetasol propionate.....0.5mg 賦形劑：Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、 Liquid petrolatum、Span 60、 Tween 80、Sodium bisulfite、 Edetate disodium、Methyl paraben 、Propyl paraben、Water purified 衛署藥製字號 036315 號 G-3507 號 本藥須由藥師處方使用 批 號： 保存期限：</p>  <p>471139301529</p>	<p>"杏輝" (外用) 可立舒 0.5毫克公克(何洛貝他素) 乳膏 - 消炎止癢劑 -</p> <p>適應症：牛皮癬、扁平瘡、皰瘡紅斑性濕疹。 用法用量：早晚各一次，在患部塗敷一薄層。 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。 貯運(15~30°C)下保存，避現日光照射，並置放於 兒童不易取得之處。 本品若有破損或完封不良，請勿使用。</p> <p> 杏輝藥品工業股份有限公司 SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD. 台灣製造 蘇山街中山路中山路24號 TEL: (886) 2-2610-1111 FAX: (886) 2-2610-1111 www.sinphar.com.tw</p>
---	--



※ 外文仿單應檢附中文譯文

註

- (1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物
- (2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃時附送現品並將照相影本代

99. 9. 16

CLOBETASOL Cream



4 713930 181379

“Siphar”
CLOBETASOL Cream 0.5mg/gm
 For External Use 15gm
 Anti-inflammatory & Anti-itch Agent



消炎止癢劑 (牛皮癬、扁平苔癬)

“杏輝”
可立舒乳膏 0.5毫克/公克 (可洛貝他素)

外用
15公克

Chobetazol propylester, White Softening Paraffin, Liquid
 Hydroxyethyl Cellulose, Hydroxyethyl Methacrylate, Sodium Bisulfite, Edetate disodium,
 Propyl paraben, Water, purified
 成份：牛皮癬、扁平苔癬、濕疹及皮膚瘙癢。
 用法：外用，每日塗抹一至兩次。

For External Use 15gm

CLOBETASOL Cream 0.5mg/gm

Anti-inflammatory & Anti-itch Agent

† Exp. Date

† Lot No.



杏輝藥業有限公司
 香港中環皇后大道中111號11樓
 電話：(852) 2511 1111
 傳真：(852) 2511 1112

G-5507號

外用
15公克

“杏輝”
可立舒乳膏

0.5毫克/公克 (可洛貝他素)

消炎止癢劑 (牛皮癬、扁平苔癬)



外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝”可立舒乳膏0.5毫克/公克(可洛貝他索) 花香味	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字第	036315 號 G-3507 號



“杏輝”

cGMP 藥品

99. 9. 16

可立舒 乳膏0.5毫克/公克(可洛貝他索) (花香味)

CLOBETASOL Cream 0.5mg/gm “Sinphar”

—— 消炎止癢劑 ——

Clobetasol propionate是個外用合成皮質類固醇。有糖皮質固醇作用及輕微的礦物皮質固醇作用。在外用方面，Clobetasol具有抗發炎、止癢及血管收縮作用，因此可用於對類固醇有反應之各種皮膚疾病。

成份：每gm含：

Clobetasol propionate.....0.5mg

賦形劑：

Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edetate disodium、Menthol、Camphor、Perfume (essence)、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified

適應症：

牛皮癬、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

用法用量：


早晚各一次，在患部塗敷一薄層。

禁忌：


- 對藥品中任何成份過敏、細菌性感染(如膿痂疹(impetigo)、癬、癬菌相繼炎)、念珠菌感染及皮癬症(dermatophytes infection)、單純性及帶狀疱疹。
- 眼用：使用於眼瞼或眼部周圍皮膚，藥品可能會進入眼中，眼瞼長期接觸類固醇，可能產生白內障或青光眼。

注意事項：

- 懷孕用藥級數：C級。
- 授乳期：目前尚不清楚外用皮質類固醇是否會有足夠的全身性吸收而使乳汁中達到可測得之濃度。全身性的皮質類固醇會分泌至乳汁中，但量尚不至對嬰兒造成破壞性影響。
- 全身性反應：外用皮質類固醇因全身性的吸收可能產生可逆性下視丘-腦下垂體-腎上腺皮質軸的壓抑作用(HPA axis抑制)、庫興氏(Cushing's)症候群及高血壓、糖尿症狀。促使藥品全身性吸收的因素包括使用強效的藥品、大範圍塗抹、長期使用以及用敷布覆蓋做隔絕密封治療。若出現HPA axis抑制現象，應停藥或減少塗抹次數或改用效價較低的藥品。
- 兒童：Clobetasol不宜使用於12歲以下之兒童。兒童因其皮膚



CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
 電話服務專線：(0800)015151 website：http://www.sinphar.com



※ 外文仿單應檢附中文譯文

產品名

衛生署給

有限公司

3507 號

99. 9. 16

表面積對體重的比例較高，故對外用皮質類固醇引起的HPA axis抑制、庫興氏症候群及顱內高血壓可能較敏感。症狀包括生長遲緩、體重增加緩慢、血中cortisol偏低、以及缺乏對ACTH刺激的反應；顱內高血壓症狀包括前凶門鼓脹(bulging fontanelles)、頭痛及雙側視乳頭水腫(bilateral papilloedema)。

HPA axis抑制一般於停藥後會立即恢復，偶而會有類固醇戒斷症狀發生，可能需補充全身性的皮質類固醇。

*Clobetasol可能於每日2g的劑量下即會產生HPA axis壓抑的作用。

*一般而言，成人每星期使用50g，兒童15g的強效外用皮質類固醇(不以敷布覆蓋)會產生輕微的HPA axis壓抑效果。成人塗抹全身一次約需12-26g。

·乾癬：外用皮質類固醇不宜當作擴散的斑狀乾癬(plaque psoriasis)中唯一治療，因為偶而在治療中或逐漸停藥時，反而會激發頑固性的乾癬。

·萎縮：身體的某些部份，如臉部、腋下及腋下較容易因使用皮質類固醇而發生萎縮現象。若這些部位必須接受治療，應經常觀察病人的反應。

*皮膚萎縮：使用強效的製劑3-4星期後可能產生皮膚萎縮現象，尤其是表皮吸收良好的部位。

*使用於眼窩旁或生殖器附近應小心。避免使用強效的皮質類固醇於臉部及對蹠的(intertriginous)部位，因可能產生皺紋。

·感染：若發生感染，應接受抗感染藥治療，若症狀未癒立即改善，則應停止皮質類固醇的治療直到感染得到良好的控制。以皮質類固醇治療皮膚的感染可能惡化感染的情形。

·不宜用於治療酒渣鼻(rosacea)，口部周圍的皮膚炎或痤瘡(acne)。

·敷布覆蓋：若有感染現象，應停止使用敷布覆蓋，並接受抗感染藥的治療。

副作用：

·局部：灼痛、瘙癢、紅疹、乾燥、毛囊炎(folliculitis)、多毛症(hypertrichosis)、粉刺狀疹、色素過低、口周圍皮膚炎、過敏性接觸皮膚炎、手指麻木感、皮膚刺痛或龜裂、繼發性感染、皮膚萎縮、產生皺紋、汗疹(miliaria)。若使用敷布覆蓋，這些症狀可能更常發生，偶而也會發生對某種敷布產生過敏的情形。

·外用皮質類固醇可能有全身性的吸收，而產生可逆性下視丘-腦下垂-腎上腺皮質軸的壓抑作用、庫興氏症候群及高血壓、糖尿症狀(參閱「注意事項」)。此現象較易發生於敷布覆蓋及使用強效藥品的病人，兒童或肝衰竭的病人發生率也較高。


·長期使用於面部周圍，可能產生白內障及青光眼。在萎縮皮膚附近，血管可能浮現於表皮，外傷部位可能有毛細管擴張(telangiectasia)及紫斑(purpura)現象。

儲存：室溫(15-30°C)下保存。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第036315號
G-3507號

包裝：1000gm以下鋁管、塑膠罐裝



杏輝藥品工業股份有限公司


SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website: http://www.sinphar.com



※ 外文仿單應檢附中文譯文

- Indications : Psoriasis, lichen planus, discoid lupus erythematoses.
- Administration & Dosage : Apply sparingly on the lesion bid.
- Precautions : Please see package insert for instructions.
- If seal broken, do not use.
- Store at room temperature.
- Keep all drugs out of reach of children.

批 號：
保存期限：詳見包裝

建議價 170 元

“杏輝”

可立舒

外用

花香味 20公克

乳膏 0.5毫克/公克 (可洛貝他素)

消炎止癢劑

- 適應症：牛皮癬、扁平苔蘚、皰狀紅斑性狼瘡。
- 用法用量：早晚各一次，在患部塗敷一薄層。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
- 成分：每 gm 含 Clobetasol propionate.....0.5mg
- 賦形劑：Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edelete disodium、Menthol、Camphor、Perfume (essence)、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified
- 衛署藥製字第 A036315338

- 室溫(15~30°C)下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或密封不良，請勿使用。
- 本品須由醫師處方使用
- 衛署藥製字第 036315 號 G-3507 號

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0980)015151 website: http://www.sinphar.com

“Sinphar”

Clobetasol

For External Use

花香味 20gm

Cream 0.5mg/gm

Anti-inflammatory & Anti-itch Agent

每 1 gm contains : Clobetasol propionate.....0.5mg
Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edelete disodium、Menthol、Camphor、Perfume (essence)、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified

“杏輝”

可立舒

外用

花香味 20公克

乳膏 0.5毫克/公克 (可洛貝他素)

消炎止癢劑

- 適應症：牛皮癬、扁平苔蘚、皰狀紅斑性狼瘡。
- 用法用量：早晚各一次，在患部塗敷一薄層。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
- 本品須由醫師處方使用。保存期限：三年。衛署藥製字第 036315 號 G-3507 號
- 室溫(15~30°C)下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或密封不良，請勿使用。
- 適用劑量請參閱說明書

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
消費者服務專線：(0980)015151

“Sinphar”

Clobetasol

For External Use

花香味 20gm

Cream 0.5mg/gm

Anti-inflammatory & Anti-itch Agent

1000gm
Clobetasol Cream 0.5mg/gm

- Anti-inflammatory & Anti-itch Agent -

- 成分：每 gm 含 Clobetasol propionate.....0.5mg
- 賦形劑：Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edelete disodium、Menthol、Camphor、Perfume (essence)、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified
- 衛署藥製字第 036315 號 G-3507 號
- 本品須由醫師處方使用
- 批 號：
保存期限：



“杏輝”

可立舒 乳膏





0.5毫克/公克 (可洛貝他素)

- 消炎止癢劑 -

- 適應症：牛皮癬、扁平苔蘚、皰狀紅斑性狼瘡。
- 用法用量：早晚各一次，在患部塗敷一薄層。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
- 室溫(15~30°C)下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或密封不良，請勿使用。

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0980)015151 website: http://www.sinphar.com

LD-142601



BO-720

99. 9. 16

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝”可立舒乳膏0.5毫克/公克(可洛貝他索)清涼型	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字第	036315 號 G-3507 號



“杏輝”

CGMP 藥品

99. 9. 16

可立舒 乳膏0.5毫克/公克(可洛貝他索)
(清涼型)

CLOBETASOL Cream 0.5mg/gm “Sinphar”

—— 消炎止癢劑 ——

Clobetasol propionate是個外用合成皮質類固醇。有糖皮質固醇作用及輕微的礦物皮質固醇作用。在外用方面，Clobetasol具有抗發炎、止癢及血管收縮作用，因此可用於對類固醇有反應之各種皮膚疾病。

成份：每gm含：
Clobetasol propionate.....0.5mg


賦形劑：
Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edetate disodium、Menthol、Methyl paraben、Propyl Paraben、Water purified

適應症：
牛皮癬、扁平苔癬、鱗狀紅斑性狼瘡。


用法用量：
早晚各一次，在患部塗敷一薄層。

禁忌：
· 對藥品中任何成份過敏、細菌性感染(如膿痂疹(impetigo)、濕疹、蟻窩組織炎)、念珠菌感染及皮膚症(dermatophytes infection)、單純性及帶狀疱疹。
· 眼用：使用於眼瞼或眼周周圍皮膚，藥品可能會進入眼中，眼瞼長期接觸類固醇，可能產生白內障或青光眼。

注意事項：
· 懷孕用藥級數：C級。
· 授乳期：目前尚不清楚外用皮質類固醇是否會有足夠的全身性吸收而使乳汁中達到可測得之濃度。全身性的皮質類固醇會分泌至乳汁中，但量少尚不至對嬰兒造成破壞性影響。
· 全身性反應：外用皮質類固醇因全身性的吸收可能產生可逆性下視丘-腦下垂腺-腎上腺皮質軸的壓抑作用(HPA axis抑制)、庫興氏(Cushing's)症候群及高血糖、糖尿症狀。促使藥品全身性吸收的因素包括使用強效的藥品、大範圍塗抹、長期使用以及用敷布覆蓋做隔絕密封治療。若出現HPA axis抑制現象，應停藥或減少塗抹次數或改用效價較低的藥品。
· 兒童：Clobetasol不宜使用於12歲以下之兒童。兒童因其皮膚



84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151 website: <http://www.sinphar.com>



※ 外文仿單應檢附中文譯文

產品

衛生署

份有限公司

G-3507 號

99. 9. 16

表面積對體重的比例較高，故對外用皮質類固醇引起的HPA axis抑制、庫興氏症候群及顱內高血壓可能較敏感。症狀包括生長遲緩、體重增加緩慢、血中cortisol偏低、以及缺乏對ACTH刺激的反應；顱內高血壓症狀包括前囟門鼓脹(bulging fontanelles)、頭痛及雙側視乳頭水腫(bilateral papilledema)。

HPA axis抑制一般於停藥後會立即恢復，偶而會有類固醇戒斷症狀發生，可能需要補充全身性的皮質類固醇。

*Clobetasol可能於每日2g的劑量下即會產生HPA axis壓抑的作用。

*一般而言，成人每星期使用50g，兒童15g的強效外用皮質類固醇(不以敷布覆蓋)會產生輕微的HPA axis壓抑效果。成人塗抹全身一次約需12-26g。

乾癬：外用皮質類固醇不宜當作擴散的頂狀乾癬(plaque psoriasis)中唯一治療，因為偶而在治療中或逐漸停藥時，反而會激發頑固性的乾癬。

萎縮：身體的某些部份，如臉部、腿股溝及腋下較容易因使用皮質類固醇而發生萎縮現象。若這些部位必須接受治療，應經常觀察病人的反應。

*皮膚萎縮：使用強效的製劑3-4星期後可能產生皮膚萎縮現象，尤其是表皮吸收良好的部位。

*使用於眼窩旁或生殖器附近應小心。避免使用強效的皮質類固醇於腋部及對蹠的(intertriginous)部位，因可能產生線紋。

感染：若發生感染，應接受抗感染藥治療，若症狀未能立即改善，則應停止皮質類固醇的治療直到感染得到良好的控制。以皮質類固醇治療皮膚的感染可能惡化感染的情形。

不宜用於治療酒渣鼻(rosacea)，口部周圍的皮膚炎或痤瘡(acne)。

敷布覆蓋：若有感染現象，應停止使用敷布覆蓋，並接受抗感染藥的治療。

副作用：

局部：灼痛、瘙癢、紅疹、乾燥、毛囊炎(folliculitis)、多毛症(hypertrichosis)、粉刺狀疹、色素過低、口周圍皮膚炎、過敏性接觸皮膚炎、手指麻木感、皮膚刺痛或龜裂、繼發性感染、皮膚瘙癢、產生線紋、汗疹(miliaria)。若使用敷布覆蓋，這些症狀可能更常發生，偶而也會發生對某種敷布產生過敏的情形。

外用皮質類固醇可能有全身性的吸收，而產生可逆性下視丘-腦下垂腺-腎上腺皮質軸的壓抑作用、庫興氏症候群及高血壓、糖尿症狀(參閱「注意事項」)。此現象較易發生於敷布覆蓋及使用強效藥品的病人，兒童或肝衰竭的病人發生率也較高。

長期使用於眼部周圍，可能產生白內障及青光眼。在萎縮皮膚附近，血管可能浮現於表皮，外圍部位可能有毛細管擴張

(telangiectasia)及紫斑(purpura)現象。

儲存：室溫(15-30°C)下保存。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第036315號

G-3507號

包裝：1000gm以下鋁管、塑膠罐裝

CGMP



杏輝藥品工業股份有限公司



SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website: http://www.sinphar.com



※ 外文仿單應檢附中文譯文

- Indications : Psoriasis, lichen planus, discoid lupus erythematoses.
- Administration & Dosage : Apply sparingly on the lesion bid.
- Precautions : Please see package insert for instructions.
- If seal broken, do not use.
- Store at room temperature.
- Keep all drugs out of reach of children.

此 號： 詳見包裝
保存期限： 詳見包裝

運送價 170 元

“杏輝”

可立舒

外用

清涼型 20公克

乳膏 0.5毫克/公克(可洛貝他素)

消炎止癢劑

- 適應症：牛皮癬、扁平苔蘚、錢狀紅斑性狼瘡。
- 用法用量：早晚各一次，在患部塗敷一薄層。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
- 成分：每 gm 含 Clobetasol propionate.....0.5mg
- 賦形劑：Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edetate disodium、Menthol、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified
- 健保代碼：A036315338

- 室溫(15~30°C)下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或充封不良，請勿使用。
- 本藥須由醫師處方使用
- 衛署藥製字第 036315 號 G-3507 號

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, IUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
銷售服務專線：(0800)015151 website：http://www.sinphar.com

Clobetasol Cream 0.5mg/gm

可立舒
Clobetasol Cream 0.5mg/gm

BO-720

99. 9. 16

“Sinphar”

Clobetasol

For External Use

清涼型 20gm

Cream 0.5mg/gm

Anti-inflammatory & Anti-itch Agent

- contains: Clobetasol propionate.....0.5mg
Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edetate disodium、Menthol、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified

“杏輝”

可立舒

外用

清涼型 20公克

乳膏 0.5毫克/公克(可洛貝他素)

消炎止癢劑

- 適應症：牛皮癬、扁平苔蘚、錢狀紅斑性狼瘡。
- 用法用量：早晚各一次，在患部塗敷一薄層。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
- 本藥須由醫師處方使用。保存期限：三年。衛署藥製字第036315號 G-3507號
- 室溫(15~30°C)下保存，避免日光直射。
- 並置放於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或充封不良，請勿使用。
- 適用劑型與劑量

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
銷售服務專線：(0800)015151

“Sinphar”

Clobetasol

For External Use

清涼型 20gm

Cream 0.5mg/gm

Anti-inflammatory & Anti-itch Agent

1000gm
Clobetasol Cream 0.5mg/gm

Anti-inflammatory & Anti-itch Agent

- 成分：每 gm 含 Clobetasol propionate.....0.5mg
- 賦形劑：Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、Tween 60、Sodium bisulfite、Edetate disodium、Menthol、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified
- 衛署藥製字第 036315 號 G-3507 號
- 本藥須由醫師處方使用
- 批 號：
- 保存期限：



“杏輝”

可立舒

0.5毫克/公克(可洛貝他素)

乳膏

- 消炎止癢劑 -

- 適應症：牛皮癬、扁平苔蘚、錢狀紅斑性狼瘡。
- 用法用量：早晚各一次，在患部塗敷一薄層。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
- 室溫(15~30°C)下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或充封不良，請勿使用。

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, IUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
銷售服務專線：(0800)015151 website：http://www.sinphar.com

