

KCG 1.0

衛部藥製字第060991號PIC/S GMP G-13776

衛部藥廠證字第(AP)0433067號



# “國嘉” 康纖散劑

## Kocel “KOJAR”

### 【成分】

主成分：每公克含

Psyllium Husk.....1公克

賦形劑：無。

本品是一種有效的、無刺激性的純天然纖維素，能幫助排便正常，可作為軟便使用。純天然的Psyllium Husk不添加其他治療藥物。本品是由Plantago ovata洋車前子外殼高度精製而成，此成分在醫療上被認為具有調節排便正常之功能。

### 【適應症】

軟便。

### 【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人：每次一小包(6公克)，每天服用1~3次，飯前、飯後或睡前，或由醫師指示使用。

兒童：6歲左右約成人劑量的一半或由醫師指示服用。

### 【注意事項】依文獻記載

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。

### 【警語】依文獻記載

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
4. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
5. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
6. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
7. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿3歲之嬰幼兒不得使用。
8. 禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心、腸道潰瘍、狹窄或粘黏之患者。
9. 需12小時至三天才會發生作用。
10. 不適用於須限制水份之患者。
11. 使用時須依指示加足量水服用，否則易引起胸痛、嘔吐、口水過多、容易噎到等食道阻塞之症狀或徵候，須停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

使用方法：



1. 一小包 (6gm) 放於一杯 8oz (240c.c.) 液體中(果汁、肉湯或水中)，冷液體可幫助混合。



2. 混合後，以果汁機、封口瓶或調合器使完全均勻調合。



3. 完全混合後立刻喝下，並追加一杯冷開水增加藥效。

**【包裝】**

12-1000公克HDPE塑膠瓶裝(600公克)、2-166包鋁箔袋紙盒裝(每包6公克)。

**【儲存】**

25°C以下避光保存。

PIC/S GMP



**國嘉製藥工業股份有限公司** 幼獅三廠  
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號  
服務專線：(04)26816197