

“景德”

氧化鎂錠

Magnesium Oxide Tablets

"Kingdom"

【主成分名】

每錠含：Magnesium Oxide250 mg

【適應症】

軟便。

【用法用量】

一日1~2次，一日以2次為限，於早晚(或服用間隔須4小時以上)空腹時(或隨餐)服用。成人1次1~2錠，12歲以上適用成人劑量。6歲以上未滿12歲，1次1/2~1錠。3歲以上未滿6歲，1次1/4~1/2錠。未滿3歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，應即停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 四、若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
- 五、使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
- 六、使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 七、除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿3歲之嬰幼兒不得使用。
- 八、禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
- 九、長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
- 十、除非有醫師藥師藥劑生指示，腎臟功能障礙之病患請勿服用本藥。

【賦形劑】

Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Talc、Microcrystalline Cellulose 101、Lactose Granule、Silicon Dioxide

【包裝】

2~1,000錠塑膠瓶裝。

【貯存】

25℃ 以下儲存。

衛署藥製字第023521號

委託者：景德製藥股份有限公司

台北市中山北路二段113號8樓

製造廠：榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路三段447號

40417004 ②