

Paxlovid



藥品衛教單



院址：新北市新店區中正路 362 號

藥物諮詢專線

總院：02-22193391 分機 15144

安康：02-22123066 分機 51360

商品名：Paxlovid Tablet 300/100 mg

學名：

Nirmatrelvir，NMV 150 mg；

Ritonavir 100 mg

藥品外觀：


NMV：橢圓形、粉紅色錠劑，刻有「PFE」、「3CL」

Ritonavir：橢圓形、白/灰白色錠劑，刻有「H」、「R9」

治療用途：

適用於發病 5 天內、具有重症風險因子的成人與 12 歲以上（體重 > 40 公斤）輕度至中度新冠病毒（COVID-19）確診者


如何服用藥品：



每日服用兩次，早晚服用 **3 錠** (療程為 5 天)
早上 1+2+3，一起服用
晚上 1+2+3，一起服用

整顆吞服，不得咀嚼、剝半或壓碎。

忘記服藥時該怎麼辦：



- (1) 忘記吃藥未超過 8 小時，馬上補吃一次，並於下次吃藥時間正常服用。
- (2) 忘記吃藥超過 8 小時，跳過該次，並於下次吃藥時間正常服用。
- (3) 請勿一次服用兩倍劑量。

可能引起的副作用：

味覺障礙、腹瀉、高血壓和肌肉痛。

藥品如何保存：

室溫下保存 (建議溫度為 25°C 以下)。

注意事項：

1. Paxlovid **尚未**被核准用於 COVID-19 的暴露前或暴露後的預防。
2. 若您感覺症狀沒有改善或者 5 天後症狀有惡化，請儘速就醫。
3. 請**完成完整的 5 天療程**，並依中央流行疫情指揮中心規定接受隔離，已達到最佳的清除病毒效果並減少 COVID-19 的傳播。
4. 由於 Paxlovid 會與許多藥品產生**交互作用**，在開始服藥前請務必告知醫師，或列出目前正在服用的所有藥物(包括非處方藥及中草藥產品)，以確保用藥安全
5. 在開始服藥前，若有以下情形，請主動告知醫師：藥物過敏史，肝/腎臟或任何嚴重的疾病，已經懷孕或計劃要受孕，正在哺餵母乳。