

“瑞安” 舒 喘
(茶 鹼)

內服液
5.34毫克/毫升

“Purzer” Ventol
(Theophylline)

Liquid
5.34 mg/mL

瑞安大藥廠股份有限公司

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP

衛署藥製字第036330號

GMP優良藥品G-3517號
本藥須由醫師處方使用

【成分】

Each mL Contains:

Theophylline Anhydrous.....5.34 mg

賦形劑：Glycerin, Methylparaben, Propylparaben, Fructose, Sucrose, Plum 1601N,
Saccharin Sodium, Purified Water.

【適應症】

氣喘及支氣管痙攣。

【用法用量】

成人：一次劑量範圍為200~250 mg，每6小時給藥一次。

6~12歲：一次劑量範圍為125~250 mg，每6小時給藥一次。

【警語】

- 劑量使用過高可能會造成毒性，所以需定期檢驗血漿中Theophylline濃度，一般血漿中濃度若超過20 µg/mL則易產生毒性反應；其最常見之一般早期毒性有噁心、浮躁，但有些病人會直接產生心室節律不整或驚厥。
- 傳統劑量易造成高Theophylline血漿濃度的原因：
 - 較低身體血漿肅清率之患者(由於短暫性的心臟代償機能衰敗造成)。
 - 肝臟功能不佳或慢性阻塞性疾病患者。
 - 年齡大於55歲，尤其是男性。
- 許多病人會因Theophylline血漿濃度過高而產生心動過速現象，且會造成潛伏性的心律不整患者病情惡化。

【注意事項】

- 不可與含Xanthine類成份之製劑合用。
- 有嚴重心臟疾病、血氧過少、高血壓、甲狀腺機能旺盛、急性心肌傷害、肺性心臟病、肝臟疾病、老年患者(由是男生)、初生嬰兒需慎重使用。
- 充血性心臟衰弱者使用時需特別注意。
- 曾有消化性潰瘍記錄之患者使用時需特別注意。
- 孕婦需評估用藥風險後慎重使用。
- 使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生之藥品相互作用。

【副作用】

主要副作用的產生均是因為血漿中濃度過高所致：

- 腸胃道方面產生噁心、嘔吐、上腹部疼痛、吐血、腹瀉。
- 中樞神經系統方面產生頭痛、刺激感、浮躁、反射應激性過度、肌肉痙攣、陣攣性或強直性驚厥。
- 心臟血管方面產生心悸、心動過速、期外收縮、潮紅、高血壓、循環不良、心室節律不整。
- 呼吸系統方面產生呼吸促迫現象。
- 腎臟方面產生尿蛋白、腎小管細胞及紅血球細胞排出增多，尿液增多。
- 其它方面產生高血糖症、抗利尿荷爾蒙ADH不正常現象。

【藥品交互作用】

- 與Ephedrine合用會增大毒性。
- 與Frusmide合用會增加利尿作用。
- 與Reserpine合用易造成心動快速。
- 與Clindamycin、Lincomycin或Erythromycin合用會增高Theophylline血中濃度。

【儲存條件】

本品應貯存於25°C以下處所。

【包裝種類】

4000毫升以下塑膠瓶裝。

瑞安大藥廠股份有限公司

地 址：台北市松山區光復南路1號12樓之2

製 造 廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠

廠 址：桃園市觀音區草漯里大同一路26號

服務電話：(02)2766-0887

C0105808