

Secorin Secorin Secorin

“生達”

益可寧

膠囊 10毫克

(歐拉)

Secorin Capsules 10mg "Standard"
(Oxazolam)

成分：
每膠囊含Oxazolam 10mg

臨床藥理：
藥效藥理--

1. 對於 (Mouse、Hamster、Rat、Monkey) 衝突反應、狂暴性、攻擊性、興奮等的實驗動物情緒障礙之抑制作用 (靜穩作用、馴化作用) 很明顯, 另一方面, 催眠、肌肉遲緩、步行失調等的自發性行動抑制作用較弱 (Mouse), 條件迴避反應的抑制也較少 (Rat)。
2. 關於靜穩作用, 從貓、兔子的實驗中, 推定其係特異的作用在扁桃核下視丘之大腦邊緣系的結果。對於人體意識水準的變化, 檢討顯示腦的興奮水準的光一眼前輪肌肉反射的影響, 並無抑制作用, 對於腦幹網樣體—新皮質賦活性 (意識水準) 幾乎無影響。
3. 對於經由Megimide、Pentetrazol引起陣發性痙攣 (Mouse、Rat), 振動誘發痙攣 (EI mouse) 有抑制效果。

藥物動力學--

依文獻資料: 健康成人七例中, 空腹時一次經口投與 20mg 後的血液中, 均有變化物質, 其主要代謝物是 N-desmethyldiazepam, 尿中主要代謝物是 2-amino-5-chlor-4-hydroxybenzophenone (ACHB) 和其共軛體及 2-amino-5-chlorobenzophenone (ACB)。

適應症：
焦慮狀態。

用法用量：

本藥須由醫師處方使用

1. 治療時, 通常成人每次 10~20mg, 一日 3 次。
2. 麻醉前投藥時, 通常手術前每 kg 體重以 1~2mg 口服。
3. 視年齡症狀, 可適宜增減。

注意事項：

一般注意：因為會引起嗜睡、注意力、集中力、反射運動能力降低, 故儘量不要從事開車等伴有危險性的機械操作。

禁忌：a. 急性狹角性青光眼之患者。
b. 重症肌無力症之患者。

慎重服用：心臟病、肝病、腎病之患者、腦部功能障礙者、嬰兒、小孩、衰弱病患、中等度或嚴重的呼吸不全患者、高齡者 (請參照高齡者的投與)。

對孕婦的投與：

- a. 據免疫學的調查報告, 懷孕中病患, 投與其他的 Benzodiazepine 系化合物時, 和對照群比較之下產生畸形兒等之殘障兒比例非常的多, 故孕婦 (3 個月以內) 只能在被判斷治療上有益, 且在挽救危機時服用。
- b. 據報告, 服用 Benzodiazepine 系化合物 (Diazepam、Nitrazepam) 會使新生兒發生哺乳困難、肌張力降低下、嗜眠、黃疸的增強等症狀。故懷孕後期的婦女只能在被判斷治療上有益, 且在挽救危機時才服用。
- c. 因有其他 Benzodiazepine 系化合物 (Diazepam), 移行至母乳中引起新生兒嗜眠, 體重減輕等之報告, 而也會有黃疸增強的可能性, 所以授乳婦要避免服用。

d. 因有其他 Benzodiazepine 系化合物 (Diazepam), 在分娩前連續服用時, 出生後的新生兒有出現禁斷症狀 (神經過敏、震顫、過度緊張等之報告)。

對高齡者的投與：因對高齡者的投與, 很容易出現運動失調等副作用, 故開始時應從少量慎重服藥。
使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時, 應注意可能產生的藥品相互作用。

併用 opioid 類藥品

Benzodiazepine 類藥品與 opioid 類藥品併用, 可能導致重度鎮靜 (profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險, 故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時, 方可考慮併用, 且應使用最低有效劑量及最短治療時間, 並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

相互作用：

和下列藥品併用 (Phenothiazine 類衍生物、Barbiturate 類衍生物等中樞神經抑制劑、MAO Inhibitors) 或是酒精類會增強其作用。

副作用：

1. 依賴性：Benzodiazepine 系化合物大量連續服用時, 偶而會引起藥物依賴, 因有此報告, 故對本藥的投與需詳細的慎重觀察, 不可過量, 長期服用如需停藥時, 則需注意要慢慢的進行減量。
2. 精神、神經系統：有時會有睡意、蹣跚、頭昏、頭痛、失眠、舌頭不靈活, 偶而也會有焦急不安定的現象出現。
3. 循環系統：麻醉前投藥偶而會有頻脈現象。
4. 消化系統：有噁心、便秘、食慾不振、胃部不舒服、下痢、口渴之現象, 偶而也會有嘔吐之現象。
5. 過敏症：如有發疹、蕁麻疹等過敏症狀出現時請停止服藥。
6. 骨骼肌：有時會有倦怠感等肌張力降低症狀。

警語：

依據隨機分派, 有對照組的臨床試驗 (Randomized controlled trial, RCT) 臨床試驗及回溯性世代研究 (Retrospective cohort study) 發現, 抗精神病藥品, 包括傳統 (Conventional) 與非典型 (Atypical) 之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患 (dementia-related psychosis) 的死亡率與安慰劑組比較, 其死亡之相對危險性較高。

貯藏：

保存在 25°C 以下。

賦形劑：

Lactose Spray Dried、Magnesium Stearate、Aerosil、Gelatin、Purified Water、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Glycerine

包裝：

6~1000 粒塑膠瓶、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 027082 號 Code No. CS-04 2215140

藥商：

PIC/S GMP 藥廠

生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫 6 之 20 號

製造廠：

PIC/S GMP 藥廠

生達化學製藥股份有限公司二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區開元路 154 號

