

# 藥品衛教單

## Nexium

### 耐適恩錠



耕莘醫院地址：新北市新店區中正路362號

安康院區地址：新北市新店區車子路15號

藥物諮詢專線

總院：02-22193391 分機15144

安康：02-22123066 分機51360

|  |  |
|--|--|
| 商品名  | Nexium Tablet - 40 mg  |
| 學名   | Esomeprazole   |
| 中文名  | 耐適恩錠   |
| 藥品外觀   | 粉紅色橢圓形膜衣錠，標記：AEI / 40 mg   |
| 治療用途   | 此藥為強力的胃酸抑制藥物，可以治療多種胃酸相關疾病 (包含腸胃出血)，也可與抗生素合併使用治療幽門螺旋桿菌感染。         |
| 如何服用藥品   | 建議空腹服用，請整顆搭配開水吞服，不可壓碎、剝半或咀嚼。若吞嚥有困難或經鼻胃管給藥需求，可將藥錠放入半杯開水中，攪拌溶解後服用。 |
| 可能的副作用   | 頭痛、腹瀉、腹脹、噁心、喉嚨痛；長時間須注意低血鎂以及骨質流失                                  |
| <b>忘記服藥時該怎麼辦</b>   |  |
| 若當天忘記服藥，請儘快補服；如接近下次服藥時間，請略過該劑量，不可同時服用雙倍劑量。   |  |
| <b>藥品如何保存</b>  |  |
| 室溫下儲存。藥品未拆封請參考包裝上有效期限；拆封後請於6個月內使用完畢，並將藥品放置在陰涼、乾燥處。   |  |
| <b>注意事項</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 長期使用需注意低血鎂，可能導致抽筋，需定期監測血鎂濃度。</li><li>✓ 長期使用者建議補充鈣與維生素D。</li><li>✓ 孕婦與哺乳期婦女請先諮詢醫師。</li><li>✓ 服藥後如有發生嚴重的腹瀉，請盡速就醫。</li><li>✓ 耐適恩與部分藥品有交互作用，若有服用 clopidogrel、warfarin、diazepam 等藥物，請先告知醫師。</li></ul> |  |