

香草牛奶

“晟德”

希普利敏液

0.4 毫克/毫升

Cypromin Solution

0.4mg/ml “Center”

GMP
衛署藥製字第 043588 號
G-6985

主 成 分：每毫升(ml)含有
Cyproheptadine Hydrochloride0.4 mg

適 應 症：

皮膚疾患引起之搔癢(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應) 枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒支氣管炎引起之咳嗽、鼻涕。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

成人：治療範圍一般每天 10~50 毫升，大部分病患用量為每天 30~40 毫升，視病情可加重至每天 80 毫升，建議初使用者每日 3 次，每次 10 毫升，每天最多不超過 0.5 mg/kg 體重。

7-14 歲孩童：每日 2~3 次，每次 10 毫升，每天最多不超過 40 毫升。

2-6 歲孩童：每日 2~3 次，每次 5 毫升，每 8~12 小時一次，每天最多不超過 30 毫升。

藥理作用：

本藥具有抗乙酰膽鹼和鎮靜的功能，為 Serotonin 及組織胺的拮抗劑，對一般之過敏反應有療效。

藥物交互作用：

1. 本藥與酒精或中樞神經抑制劑併用，具加乘作用。
2. MAO inhibitors 會延長並加強乙酰膽鹼效果。

注意事項：

1. 新生兒、早產兒、授乳之母親及對 Cyproheptadine 或 MAOI 敏感者禁止使用本藥。
2. 青光眼、前列腺肥大、氣喘、幽門狹窄、年老虛弱之病人禁用本藥。
3. 二歲以下兒童之用量尚未建立。
4. 小孩或嬰兒服用過量會造成嗜睡、中樞神經抑制、痙攣和死亡。
5. 老年人服用本藥易造成眩暈、鎮靜和低血壓。
6. 服用本藥後應避免開車或操作機械。

副作用：

1. 嗜眠、噁心、下痢、腹痛、頻尿等。
2. 在血液方面有：紫斑、血小板減少、白血球減少之現象。
3. 過敏症狀：發疹、水腫、蕁麻疹、對光敏感。

包 裝：60~4000 毫升塑膠瓶裝

儲 存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於 25°C 以下，請勿冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)
CENTER LABORATORIES INC.

地 址： 臺北市南港區園區街 3 之 2 號 7 樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址： 新竹縣湖口鄉實踐路 2 號

公司電話： (02) 2655-8680 圖文傳真： (02) 2655-8380

工廠電話： (03) 598-1829 圖文傳真： (03) 598-1820

CTRA-032 20120222

14C04-B01