

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Repaglinide Tablet - 1 mg★

藥物學名: Repaglinide (柔糖錠)

藥品外觀: 黃色圓形錠劑, 有刻痕, 標記: CCP C74



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

此藥屬於降血糖藥物, 可用於第二型糖尿病的血糖控制。

使用方法 (Directions)

建議於用餐前15分鐘內或即將用餐時服用, 並搭配適量白開水吞服。可依需要剝半或磨粉服用。

忘記服藥時 (Missed dose):

如忘記服藥, 請儘快補服。若已接近下一次服藥時間, 則跳過該次劑量, 不可一次服用兩倍劑量。

注意事項 (Warnings)

- 服用藥品期間, 請定期監測您的血糖值; 若有血糖偏低的狀況, 請勿開車, 否則發生意外的危險性會增加。
- 造成低血糖的風險較低, 但若有服用其他降血糖藥物, 須瞭解低血糖的症狀, 包含頭昏、頭痛、嗜睡、虛弱無力、心跳加快等。隨身備有葡萄糖錠、葡萄糖水或含糖食物, 低血糖發生時可立即使用。
- 若已經懷孕、計畫懷孕或有哺乳需求, 請告知醫師。
- 本品須於用餐前服用, 未進食則不需服藥, 避免低血糖。

副作用 (Side Effects)

低血糖、頭痛、上呼吸道感染。

保存 (Storage)

室溫下儲存。若藥品未拆封, 請參考包裝上的保存期限; 拆封後的藥品最多可保存6個月, 請放置在陰涼、乾燥處。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/09 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院