

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Thado Capsule - 50 mg

藥物學名: Thalidomide (賽得膠囊)

藥品外觀: 橘色與白色不透明膠囊, 標記: Thado



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

此藥品為免疫調節劑, 與其他藥物併用可用於治療新診斷的多發性骨髓瘤。

使用方法 (Directions)

搭配開水口服, 最好在睡前或晚餐後一小時服用。請勿自行打開膠囊服用以免粉塵吸入。

忘記服藥時 (Missed dose):

一旦想起漏服, 就立即補服, 如果距離漏服劑量已經過去 12 小時或更長時間, 請跳過漏服的劑量, 並恢復正常服藥時間, 不要同時服用兩劑或額外劑量。

注意事項 (Warnings)

- 女性使用者若具生育能力, 使用前須驗孕並採取雙重避孕措施, 且治療前、期間與停藥後四週皆須持續避孕。服藥期間不可授乳。
- 男性使用者在治療期間與具生育能力女性有性行為時, 需全程使用乳膠保險套, 即使已結紮亦然。
- 使用本藥期間不可捐血, 男性亦不可捐精。
- 使用期間請避免開車及操作機械, 因可能導致嗜睡或暈眩。
- 若出現手腳麻木、刺痛、呼吸困難、胸痛、腿部腫脹等症狀, 請立即通知醫師。

副作用 (Side Effects)

嗜睡、便秘、頭暈、疲倦、皮疹、周邊神經麻木或刺痛感。

保存 (Storage)

請保存於室溫25°C以下, 避免潮濕及陽光直射, 保存在原鋁塑包裝中, 需服用時再取出。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/27 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院