

Carbizo

Carbizo

Carbizo

Ca

## "優生" 抗泌腫錠 10公絲

(卡必麥宗)

**Carbizo** Tablets 10mg "Yu Sheng"  
(Carbimazole)

衛署藥製字第033933號  
GMP G-2282號

【組成】：每錠含：

Carbimazole.....10mg

【性質】：

本品為甲狀腺抑制劑，及阻斷有機化合物碘和甲狀腺鍵結能力。

【適應症】：

甲狀腺機能亢進，甲狀腺中毒症，白色陀氏病，甲狀腺手術前治療基礎新陳代謝過高。

【用法·用量】：

抗泌腫錠依病症的性質與程度區分給藥量，成人劑量：

初劑量：1日1~6錠。

輕度病例：1日3次，每次1/2錠

中度病例：1日3次，每次1錠

嚴重病例：1日3次，每次2錠

直至醫師檢查有恢復正常情況時，再使用維持劑量，每日半錠~2錠。

服用此藥必須飯後伴服開水使用。

本藥須由醫師處方使用。

【副作用與伴隨症狀】：

抗泌腫錠在罕有的情況下，可能會引起噁心、頭痛或發炎偶有的情況下有發燒顆粒性的白血球缺乏症，應在服藥前12週內，約每星期定期實施血象控制。

【注意事項】：在懷孕最後3~4個月，以及哺乳期間，請勿使用此藥。

【賦形劑】：Lactose, Povidone(PVPK-30), Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Tartrazine

【包裝】：6~1000錠塑膠瓶裝



優生製藥廠股份有限公司  
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201511