

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Bethanechol Tablet - 25 mg

藥物學名: Bethanechol (滯尿通錠)

藥品外觀: 淡黃色圓形錠劑, 標記: J / 13



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

手術後、產後之非阻塞性尿液滯留; 神經性膀胱功能異常之尿液滯留。

使用方法 (Directions)

空腹使用。

忘記服藥時 (Missed dose):

一旦想起漏服的劑量, 就立即補服, 如果快到下次服藥時間, 請跳過漏服的劑量, 不要同時服用兩劑。

注意事項 (Warnings)

- 有甲狀腺功能過高、氣喘、癲癇、心臟血管疾病及胃腸、泌尿道有機械性阻塞病史者, 請先告知醫師。
- 若出現呼吸困難、口乾、畏光、癲癇、心跳不規律等症狀時, 請盡速就醫。
- 可能會有眩暈或嗜睡作用, 開車、操作機械時要多加留意。
- 不建議用於懷孕婦女, 如已經懷孕、有懷孕計畫, 請務必告知醫師。

副作用 (Side Effects)

潮紅、腹瀉、噁心、低血壓。

保存 (Storage)

室溫下儲存, 藥品拆封前請參考包裝上的有效期限; 藥品拆封後自拆封日起可放置六個月。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/06 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院