

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Tarceva F.C Tablet - 150 mg

藥物學名: Erlotinib (得舒緩膜衣錠)

藥品外觀: 白色圓形錠劑, 標記: 150



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

標靶抗癌藥物, 用於具EGFR突變之非小細胞肺癌以及曾接受化療後仍惡化的肺腺癌。

使用方法 (Directions)

須空腹服用, 即飯前至少1小時或飯後2小時使用, 請搭配開水整顆吞服。

忘記服藥時 (Missed dose):

一旦想起漏服的劑量, 就立即補服。如果快到下次服藥時間, 請跳過漏服的劑量, 不要同時服用兩劑或額外劑量。

注意事項 (Warnings)

- 服藥期間請避免抽菸, 吸菸會降低藥效。
- 避免與制酸劑質子幫浦抑制劑併用。若與H₂受體拮抗劑併用, 應在服用H₂受體拮抗劑10小時後或服用H₂受體拮抗劑前至少2小時服用。
- 若出現嚴重腹瀉、皮膚起水泡或眼睛異常(如疼痛、視力模糊), 請盡速就醫。
- 服藥時請避免與葡萄柚汁併用。
- 在治療期間, 以及治療完成後的至少2週內, 都應採取適當的避孕方法。治療時及最後一劑後至少2週不得授乳。
- 本藥可能造成皮膚對陽光較敏感, 外出請注意防曬。

副作用 (Side Effects)

皮膚出現紅疹、搔癢、乾燥, 以及腹瀉、食慾不振與疲倦感。

保存 (Storage)

請存放於室溫中(不超過30°C), 請參照包裝所示之有效期限。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/25 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院