

"普斯特"愛得寶外用撒布散 IODOSORB® POWDER

Cadexomer Powder with Iodine

本藥須由醫師處方使用

衛署藥輸字第 017039 號

使用前小心閱讀產品使用說明書。

閱讀後若有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。

97. 7. 01

本品以伽瑪放射線滅菌。

* 請自行修正刊印

本品僅限於單次使用。當本品已開封或已超過包裝上標示之效期，請勿使用。請儲存於乾燥處所(25°C以下)。

【產品說明】

IODOSORB® Powder 為滅菌之深棕色粉末，由 cadexomer (為澱粉微珠經修改而成) 與碘所組成，cadexomer 小珠可被生物分解。IODOSORB® Powder 能移除傷口之滲出物及壞死組織，減少傷口表面的細菌生長。當 IODOSORB® Powder 粉末吸足了傷口滲出物後，就會形成濕軟之膠體。

【適應症】

慢性靜脈潰瘍之輔助治療、感染性傷口之輔助治療

【禁忌症】

不可用於乾燥的壞死性組織、或對碘過敏或對本品其他成份過敏者，請勿用於兒童、孕婦、授乳婦女或有腎功能不全或甲狀腺機能不全者(如：Hashimoto 自體免疫性甲狀腺炎或非毒性結節性甲狀腺腫)。

【警語】

本品與鋰鹽(Lithium)有交互作用的潛在危險，而可能造成甲狀腺機能不足。不可併用含汞之抗菌劑或 taurolidine。若病人即將進行甲狀腺功能測試，他們必須告知醫師。

【注意事項】

1. 一包 IODOSORB® Powder 僅限一位患者使用。
2. 請勿將本產品接近眼睛、耳朵、鼻子或嘴巴。
3. IODOSORB® Powder 僅限外用。
4. IODOSORB® Powder 在使用後第一個小時內也許會造成短暫輕微的疼痛；這種徵兆是因為 IODOSORB® Powder 開始清潔傷口了。有時，IODOSORB® Powder 會使傷口邊緣的皮膚腫脹或變紅；此現象通常會消失。若是症狀持續或病人出現其他的症狀，應與醫師或護士連絡。
5. 應儘量減少觸及傷口周圍的皮膚及正常的皮膚。
6. 若留置 IODOSORB® Powder 完全乾掉，可能會形成黏連的痂皮。
7. 如果治療大面積傷口，單次使用劑量不可超過 50 公克 (相當於 3 公克小包的 16 包)，一週內不可超過 150 公克 (相當於 3 公克小包的 50 包)。
8. 單次療程不可超過 3 個月。

【使用步驟】

使用 IODOSORB® Powder

1. 使用前、後須充分洗手。戴手套使用生理食鹽水或蒸餾水清潔傷口及周邊皮膚。勿擦乾傷口。
 2. 將 IODOSORB® Powder 敷於傷口表面形成 3mm 的厚度，並符合傷口的形狀，再次適量敷用以確使傷口已完全被覆蓋。如有需要，覆以壓力繃帶。剩餘的敷料應該丟棄。
- 更換 IODOSORB® Powder
1. 當 IODOSORB® Powder 為傷口滲出液所飽和並失去原來的顏色時(表示碘已釋出)須換藥，通常每週更換 2 到 3 次。若是傷口滲出情況嚴重，可以每日換藥。如果需要，可以先浸潤敷料數分鐘後再予以清除。
 2. 使用生理食鹽水或蒸餾水沖洗移除 IODOSORB® Powder。
 3. 輕輕地吸除任何過多的液體，使傷口表面保持微濕，再使用 IODOSORB® Powder。

包裝


66001286 7x3g

製造廠名：Perstorp Pharma, Perstorp Specialty Chemicals

製造廠址：S-284, Perstorp, Sweden

藥商名稱：英商史耐輝(股)公司台灣分公司

藥商地址：台北縣汐止市龍安路 28 巷 6 號 9 樓之 4



nicals

