

“紐約”新黴素軟膏

Neomycin Ointment “N.Y.”

內衛藥製字第011122號

“紐約”新黴素軟膏每公克內含硫酸新絲菌素5公絲，相當於新絲菌素3.5公絲。

賦形劑：Polyethylene glycol 400、Polyethylene glycol 3350

硫酸新絲菌素是一種廣效抗生素，對多種革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌均有強力之制殺作用，其抗菌範圍較菌黴素(Bacitracin)、盤尼西林及鏈黴素為廣。若就陽性菌類而言，其制殺外傷化膿發炎之葡萄球菌較之制殺鏈球菌之力量更為強大而顯著，對帶形菌屬及變形菌等感染也具同等之療效。本品外用，細菌不會產生抗藥性、對人體無毒性、對患部無刺激性。

適應症：

急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

用法用量：

2-4次/天，塗於患部。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

副作用：

- 1.過敏性皮膚炎。
- 2.繼發性感染。
- 3.耳及腎毒性。

注意事項：

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 10.深部皮膚組織感染請就醫治療。

警語：

- 1.對藥物各成分過敏者不得使用。
- 2.長期使用有可能引起繼發性感染。
- 3.會使衣物染色。

包裝：100公克以下管裝、瓶裝，450公克瓶裝。

儲存條件：請於25°C以下陰涼處保存。

PIC/S GMP



人人化學製藥股份有限公司中壢廠
桃園市中壢區南園二路3號