

“台裕” 安西諾隆 注射液 10 毫克

***Triamcinolone Suspended Injection 10mg “Tai Yu”***

【成分】

Each ml contains:

Triamcinolone Acetonide..... 10mg

【適應症】

變形性關節炎、外傷性關節炎、脊椎炎、腱炎、腱周圍炎、坐骨神經痛、尋常性濕疹、支氣管氣喘、皮膚炎、乾癬。

【用法用量】

1.成人：

- (1) 關節內注射每次 2.5mg ~ 40mg，若有症狀再出現時，再作第二次或第三次注射。
- (2) 肌肉注射每次 40mg ~ 60mg，若有症狀再出現時，再作第二次或第三次注射。

2.兒童：

(六歲以上)肌肉注射每次每公斤體重用 30mcg ~ 200mcg (即µg)，每日一次至每週注射一次。

3.本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 在使用前要再充分振搖以得均勻的懸濁液，並且要立即注射，以免在注射筒內產生沈著。
2. 不可行靜脈或者皮內注射。
3. 急慢性感染症使用時，請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
4. 對消化管障害如胃腸潰瘍務請特別注意。
5. 因主要副作用引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
6. 糖尿病患者使用時，有增加 Insulin 藥量的必要者請注意。
7. 對於有精神病因素者多加注意。
8. 使用本劑期間，請充分補充蛋白質。
9. 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
10. 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

【賦形劑】

Sodium Chloride、Carboxymethylcellulose Sodium、Tween 80、Benzyl Alcohol、Water for Injection。

【保存方法】25°C以下避光貯存。

【包裝】

1ml、5ml 玻璃安瓿裝，100 支以下盒裝。

10ml 玻璃小瓶裝，100 支以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司

TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL : (03)5826655

FAX : (03)5822389