

130.00 mm

150.00 mm

“晟德”

適優喘液

5.34毫克/毫升

Centertheo liquid

5.34mg/ml "CENTER"

GMP
衛署藥製字第 044083 號
G-7310

主成份：每毫升(ml)含有

Theophylline (anhydrous).....5.34 mg

適應症：
支氣管痙攣。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

6-12歲孩童：一次劑量125-250 毫克，每六小時一次。

成人：一次劑量為200-250 毫克，每六小時一次。

注意事項：

- 1.過去曾使用xanthine系藥劑而有嚴重副作用者禁用。
- 2.下列患者使用時應特別注意：急性腎炎、甲狀腺機能亢進症、癲癇、幼小兒、急性心肌梗塞、嚴重心肌障礙患者。
- 3.與其他xanthine系藥劑或中樞神經興奮藥併用時，會呈現過度的中樞神經刺激作用。
- 4.使用本藥品時併服葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。
- 5.避免飲用含咖啡因飲料(如咖啡、茶)。
- 6.本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

副作用：

- 1.偶有胃腸障礙作用、噁心、嘔吐等現象。
- 2.若有胃痛並有嘔吐現象、發抖、肌肉痙攣、虛弱、神志不清、心律不整等症狀發生時，應即刻告知醫師。

賦形劑：Sodium Benzoate, Methylparaben, Saccharin Sodium, Citric Acid Anhydrous, Aspartame, High Fructose Syrup, New Coccine, Tartrazine, Caramel Flavor, Water Purified

包裝：60~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地 址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-036 20150728

14C01-D02