

“美時”

衛署藥製字第029825號

**皮質醇軟膏 1% (乙酸皮質醇)****Cort. S. Ointment 1%**

(Hydrocortisone Acetate) “LOTUS”

“美時”皮質醇軟膏，含有1%的Hydrocortisone Acetate，對於諸類炎症，效果佳，作用快速，並且亦具有抗過敏作用。

**【主成份】**

Each gm Contains:

Hydrocortisone Acetate .....10mg

**【賦形劑】**

Lanolin anhydrous

White petrolatum

**【藥理作用】**

本品主成份Hydrocortisone Acetate是一種葡萄糖皮質類固醇。

會抑制滲出作用Exudation，抑制細胞的增值Proliferation與微血管之擴大，故有抗發炎作用Anti-inflammation，亦能使嗜伊紅性白血球Eosinophil及抗體之生成減少；抑制Histidine decarboxylase之作用，使組織胺Histamine之生成減少，故有抗過敏作用。

**【適應症】**濕疹或皮膚炎。**【用法用量】**塗於患部。醫師藥師藥劑生指示藥品。**【副作用】**

- (A)局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、癬子、毛細管擴張。
- (B)全身性：庫欣氏症候群（Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）、繼發性腎上腺功能不足（secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等）。

**【注意事項】**

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼晴內，亦不得施於眼晴四周或黏膜。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
11. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。

**【警語】**

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4. 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
5. 皮膚的細菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

**【儲存條件】**

儲存於25°C 以下。

**【包裝】**

1000公克以下塑膠瓶裝



美時化學製藥股份有限公司  
南投縣南投市新興里成功一路30號



041015