

寬樂醣[®]膜衣錠 500 毫克

Metformin F.C. Tablets 500 mg “CYH”

綱號：E99

成分：Each F.C. Tablet contains：

Metformin Hydrochloride ……500mg

適應症：糖尿病

藥理作用：本藥是一種雙胍類(Biguanide)口服抗糖尿病製劑，可改善NIDDM(非胰島素依賴型)類型病患的葡萄糖耐受性，降低基礎代謝及餐後的血糖值。它的作用模式被認為是多重階段式的，包括：延遲葡萄糖被腸胃道的吸收，藉由增加胰島素的感受度，來增加周邊葡萄糖的利用率，以及抑制肝腎的糖質新生增加。

用法、用量：本藥須由醫師處方使用。

腎絲球體過濾率(eGFR)介於 30~45ml/min/1.73m² 應減量使用。

服用劑量的多寡將視患者臨床檢測出的血糖值而定。通常，每日服用二次，每次服用一錠。於用餐時或餐後服用。

服用藥物時間與頻率：

本藥品請於用餐時或飯後服用。請整錠吞服，不要咀嚼。例如：每日服用劑量是二錠，早餐服用一錠，晚餐再服用一錠。在任何情況下，均須遵守醫師處方的規定。

(1)Metformin 之每日最高治療劑量速效劑型:3000mg; 緩釋劑型:2000mg。

(2)80歲以上老年病人不建議開始使用Metformin治療。

(3)Metformin 用於治療 80 歲以下之老年患者時，應特別謹慎。

警語：Metformin 有導致代謝性酸中毒(例如：乳酸中毒)之風險，醫療人員宜提醒病患該不良反應，倘若出現代謝性酸中毒之不良反應，應立即停藥並回診開立處方之醫師。

禁忌症：

1.腎臟病，及因心血管衰竭，心肌梗塞或敗血症引起的腎功能不良症。

2.在注射放射碘治療過程中，應暫時停止服用本藥，因其會導致腎功能急性轉變。

3.已知本藥會引起過敏反應者。

4.急性代謝性酸中毒，包含昏迷與否的糖尿病酮酸中毒。

5.腎絲球體過濾率(eGFR)小於 30ml/min/1.73m² 禁用。

副作用：

1.乳酸中毒：只有少數案例，存在於有禁忌症時的治療過程中；一旦發生代謝性酸中毒，且缺乏酮酸中毒證據時，就該懷疑是乳酸中毒，並停止本藥治療。

2.胃腸道反應：本藥耐受性良好，最常發生的副作用，就是輕微、短暫性的胃腸不適，特別是開始治療時，此現象通常是短暫的，且在持續治療中會自然消失。可由飯中服用或暫時減少劑量來避免或改善此副作用，不可突然停用本藥，除非發生嚴重的下痢或嘔吐導致脫水現象，才須暫停本藥。

3.紅疹或皮膚炎極少發生。

4.長期治療時，每年定期檢查血清 Vitamin B₁₂ 值。

注意事項：

1.本藥係由腎臟排泄，所有糖尿病患者均應定期檢查腎功能，特別是年老病患，常伴隨腎功能衰退，服用本藥前後，尤須格外注意監控腎功能變化。

2.本藥若與其他經由腎臟分泌排泄的藥物，共同服用時，須注意其對腎功能及本藥於血中分布的影響。

3.外科手術期間，須暫停本藥治療，直到恢復進食及腎功能回復正常，才再開始服用本藥。

4.已知酒精會強化本藥的乳糖代謝效果，因此病人服藥期間，不得攝取過量酒精。

5.服用本藥而控制良好的糖尿病患者，若發展到檢驗結果或臨床症狀出現不正常時，應立即評估是否有無酮酸中毒或乳酸中毒，一旦發生時應立即停藥。

6.單獨正常服用本藥，並不會發生低血糖症狀，除非熱量攝取不足，或併服其他降血糖藥如 Sulfonylureas 或酒精，才可能發生低血糖。

7.藥物交互作用：同時服用下列藥物時，須注意監控本藥的濃度變化，包括：Furosemide，Nifedipine，Cationic drugs，Diuretics 及其他會影響血糖的藥物。

8.沒有充分數據可證明懷孕、哺乳及嬰兒期的安全性，故此時期不建議使用。

9. (1)靜脈注射顯影劑有導致急性腎功能下降之危險，因此醫師為病患注射顯影劑應先停用 Metformin，且需確認病患術後之腎功能恢復正常，才能再開始使用該藥品。(2)醫師為病患處方 Metformin 時，需定期監測其腎功能。

貯存：請貯存於 25°C 以下、陰涼、小孩接觸不到之處所。

包裝：4~1000 錠 PTP 鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。

賦形劑：

Avicel 101

P.V.P. (K-30)

Magnesium stearate

H.P.M.C 6 cps

H.P.M.C 15 cps

Titanium dioxide

Propylene glycol

Alcohol (不殘留於最終產品)

Water purified (不殘留於最終產品)

委託者



中化裕民健康事業股份有限公司
Chungwa Yuming Healthcare Co., Ltd.
台北市中正區襄陽路23號8樓

製造廠



中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號®