



“永信”

微小循環改善劑

克栓

(配妥西菲林)

THRONE

腸溶糖衣錠
100公絲

(Pentoxifylline)

Enteric-Sugar Coated Tablets 100mg "Yung Shin"

THT-005
衛署藥製字第027011號
Code No.:38174

3.98cm

【成分名】

Pentoxifylline

【劑型、含量】

腸溶糖衣錠：每錠含Pentoxifylline.....100mg

【賦形劑】

Lactose、Sodium Starch Glycolate、Colloidal Silicon Dioxide、Hydroxypropyl cellulose、Talc、Magnesium Stearate、Hydroxypropylmethyl cellulose、Dimethylpolysiloxane、Hydroxypropylmethyl cellulose phthalate、Acacia、Gelatin、Sucrose、Tartrazine、Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate、Titanium Dioxide。

【臨床藥理】

Pentoxifylline可促進末梢血液循環，作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。吸收後很快經肝臟代謝(First-pass effect)成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。

【適應症】

末梢血管循環障礙。

【用法·用量】

本藥須由醫師處方使用。

- 通常成人劑量，一天3次，每次100~400mg，伴著些液體整粒吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時，則其劑量應減量，如果其副作用仍然持續，則停止服用。
- 雖然在治療2~4週後，即會出現療效，但仍須持續治療八週以上。
- 有低血壓，血壓不穩的患者或腎功能不良者，須調整個別劑量。

【注意事項】

- 腎功能不全之患者，Pentoxifylline廓清率降低，可能引起毒性，需減少劑量。
- 對Pentoxifylline有敏感性的病人不可服用此劑。
- 有視網膜出血或急性心肌梗塞及懷孕中的婦女不可服用本劑。
- Pentoxifylline和其它代謝物會排泄於乳汁中。老鼠實驗中有引起腫瘤的可能，應依此藥對母親之重要性審慎評估。
FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：C
- 18歲以下兒童安全性尚未建立。
- 禁忌：對Pentoxifylline或Methylxanthines (如Caffeine、Theophylline、Theobromine) 過敏者禁用。

【相互作用】

Pentoxifylline會延長Prothrombin time，增加出血機會。因此使用Warfarin的病人要時常監測PT。有出血傾向者要定期檢驗血液實驗值 (包括血紅素、血比容)。

【副作用】

- 一般症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈 (碰到這些症狀，須作適量的劑量調整)。
- 皮膚潮紅、心跳加快，胸氣塞或低血壓 (這些副作用可能是因為高劑量的服用，須將劑量減低，作適量調節)。
- 少數副作用例子有搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫 (這些副作用作適量的劑量調節即可)。
- 本藥中毒之症狀與劑量有關，通常出現於服用4~5小時後並持續12小時。症狀有潮紅、低血壓、緊張、興奮、顫抖、痙攣、嗜睡、意識喪失、發燒和激動。治療：洗胃並使用活性炭。監測心電圖與血壓。除了症狀治療外，維持呼吸與血壓，治療心律不整並控制痙攣。

【儲存條件】

室溫下儲存。

【包裝】

6~1000粒瓶、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2144603