

# 藥品衛教單

## Rivotril 0.5

利福全錠



耕莘醫院地址：新北市新店區中正路362號

安康院區地址：新北市新店區車子路15號

藥物諮詢專線

總院：02-22193391 分機15144

安康：02-22123066 分機51360

商品名	Rivotril Tablet - 0.5 mg
學名	Clonazepam
中文名	利福全錠
藥品外觀	淺橘色圓形錠劑，有刻痕。標記:0.5
治療用途	此藥品屬於苯二氮平類藥物，可用於幫助睡眠、緩解肌肉抽筋及癲癇症狀。
如何服用藥品	可與食物併服或空腹服用，請以開水整顆吞服。需要時可剝半或者磨粉。
可能的副作用	疲倦、頭暈、注意力不集中、記憶力下降、腸胃不適，多數症狀在持續用藥一段時間後會改善。服藥後隔日可能仍有暈眩感。
<b>忘記服藥時該怎麼辦</b>	
治療失眠：若發現忘記吃藥的時間，請盡快服用，以確保良好睡眠品質。 治療焦慮或抽筋：若發現忘記吃藥的時間，尚未超過下一次服藥時間的一半，請補吃藥物；若已超過時間則略過該次服藥，於下次服藥時間服用。	
<b>藥品如何保存</b>	
室溫下 (30°C) 儲存。若藥品未拆封，請參考包裝上的保存期限；拆封後的藥品最多可保存6個月，請放置在陰涼、乾燥處。	
<b>注意事項</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 服藥後可能會造成頭暈，請避免開車或操作機械。</li><li>✓ 服藥期間請避免飲酒，以免加重藥效導致副作用發生。</li><li>✓ 若有懷孕計畫、已懷孕或者正在哺乳，請先告知醫師，經醫師評估後再使用。</li><li>✓ 老年人及糖尿病人應小心使用，須注意跌倒風險。</li><li>✓ 長期使用可能導致對藥品的依賴性，停藥時可能會產生戒斷症狀，因此停藥時應與醫師討論並逐步減量，切勿自行忽然停藥。</li><li>✓ 使用此藥品期間，請勿吸煙、食用葡萄柚或者喝葡萄柚汁。</li></ul>	