
 實大 (刀線)
 噴膠區, 勿設計
 封面版次: 040618
 產品編號: MLZC001 / 檔案修改日期: 07.07.15 07/08/15

<p>Soft Capsules 100mg ZCOUGH 咳治得 軟膠囊 100毫克</p> <p style="text-align: right;">本藥須由醫師處方使用</p> <p style="text-align: right;">GMP G-12215 衛部藥製字第 058202號</p> <p>【成份】 每粒軟膠囊含Benzonatate 100mg</p> <p>【賦形劑】 Gelatin 160、Glycerin、Purified Water</p> <p>【藥理】 咳治得軟膠囊 100毫克為一非麻醉性口服止咳劑。咳治得軟膠囊 100毫克對於周邊之作用乃經由麻醉吸道、肺部、肋膜上之牽張接受器(stretch receptor)而減弱其活性，從發源處減少咳嗽之反射。藥效開始約在服用後15-20分鐘內，作用維持約3-8小時。建議劑量下並無抑制呼吸中樞之作用。</p>	<p>【適應症】 解除咳嗽症狀。</p> <p>【禁忌症】 依文獻記載 對於benzonatate或相關化合物過敏者。</p> <p>【注意事項】 依文獻記載 1. 十四歲以下兒童及吞嚥困難者不得使用。 2. 若膠囊於口中崩解，主成分之釋出會使口腔黏膜產生短暫之局部麻醉而可能有梗塞感；因此本藥不可咀嚼而需要直接吞服。 3. 孕婦：應於必要之情況下才可投與(未有動物試驗建立其對胎兒之影響性)。 4. 授乳婦：此藥於乳汁中的分泌情形尚未確立，給藥時仍需密切注意。 5. 未有試驗研究其致癌、突變或對生育力之影響。</p> <p>【副作用】 依文獻記載 曾有鎮靜、頭痛、輕微眩暈、癢感、發疹、鼻塞、便秘、噁心、</p>	<p>腸胃不適、眼灼感、怕冷、胸悶、過敏被報告過。</p> <p>【過量】 依文獻記載 未有明確案例被報告。此藥之化學結構類似tetracaine及某些局部麻醉劑，也同樣會具有其藥理與毒物學方面的特性。此類藥物通常口服後吸收良好。</p> <p>【中毒症狀】 依文獻記載 若膠囊於口中嚼碎，口咽部會快速產生麻痺感；中樞之刺激可能導致無法安靜、震顫；進一步之中樞抑制作用可能導致間歇性肌陣攣。</p> <p>【中毒之處理】 依文獻記載 1. 洗胃、給予活性炭，即使病人意識清醒，其咳嗽與嘔吐反射可能受抑制而須特別加護以防止病患吸入胃內容物或被投與之口服藥。 2. 若發生經攣則應靜脈注射短效型巴比妥鹽，須注意控制其最小有效劑量。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 在嚴重中毒時之治療重點為呼吸急救措施與心血管、腎功能之醫護。

4. 勿投與中樞刺激性藥物。

【劑量】
成人每日三次，每次1-2膠囊。

【包裝】
6-1000粒塑膠瓶裝。

【儲存條件】
請置於25°C下儲存。本品應存放在兒童拿取不易之處。

【保存期限】
敬請注意遵守包裝盒上註明的保存期限。

委託者：美喬生技有限公司
地 址：臺北市大安區復興南路一段200號7樓之1

PIC/S GMP 藥廠
製造廠：美時化學製藥股份有限公司 南投廠
地 址：南投縣南投市新街里成功一路30號

<p>【成份】 每粒軟膠囊含有 Benzonatate.....100mg</p> <p>【適應症】 解除咳嗽症狀。</p> <p>【儲存條件】 請置於25°C以下儲存。 本品應存放在兒童拿取不易之處。</p> <p>批 號： 保存期限：</p>	<p>Soft Capsules 100mg ZCOUGH 咳治得 軟膠囊 100毫克</p> 	<p style="text-align: right;">GMP G-12215 衛部藥製字第 058202號</p> <p style="text-align: right;">500粒 膠囊 本藥須由醫師處方使用</p> <p>【劑量】、【禁忌症】、【注意事項】、【副作用】、【過量】、【中毒症狀】、【中毒之處理】等 請詳閱說明書。</p> <p style="font-size: small;">委託者：美喬生技有限公司 地 址：臺北市大安區復興南路一段200號7樓之1 PIC/S GMP 藥廠 製造廠：美時化學製藥股份有限公司 南投廠 地 址：南投縣南投市新街里成功一路30號</p> <p style="text-align: right;">040618</p>
 4 719693 809819		