


# 外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	Zalain Vaginal Tablets 達來陰道錠	申請廠商	科進製藥科技股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製 字第 044451 號		

104.3.16



## 達來<sup>®</sup> 陰道錠 ZALAIN<sup>®</sup> Vaginal Tablet

G-7534

衛署藥製字第 044451 號

- 【藥理作用】 Sertaconazole 是一種新的局部抗黴菌劑，具有強力的抗黴菌效果，而且殺菌範圍很廣，如：致病之酵母菌 (包括白色念珠菌 *Candida albicans*，喬比卡利氏念珠菌 *C. Tropicalis*，各種念珠菌 *Candida spp.*，環狀糠疹癬菌 *Pityrosporum orbiculare*) 及其他造成皮膚和黏膜合併感染之格蘭氏陽性菌 (包括葡萄球菌屬、鏈球菌屬) 等。本品對陰道滴蟲 (*Trichomonas vaginalis*) 也有殺菌效果
- 【主成份】 每錠含 Sertaconazole nitrate 500mg
- 【賦型劑】 Maize Starch, Sodium Starch Glycolate, Microcrystalline Cellulose, Glyceryl Behenate, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate
- 【適應症】 治療黴菌 (多數為白色念珠菌) 引起之陰道感染症

- 【禁忌症】 對 Sertaconazole 及 Azole 衍生物過敏者不可使用本藥
- 【注意事項】 為了增進本藥在陰道之局部作用與吸收，最好在睡前使用本藥  
由於本藥使用後可能在陰道會有少許排出液，建議使用前以護墊保護內褲。
- 【交互作用】 到目前為止尚未發現有任何藥物交互作用
- 【警語】 懷孕或授乳婦女：對於懷孕或授乳婦女使用本品之安全性仍未被證實。此等患者如須治療時，必須由醫師來評估是否可以使用本藥。婦女月經週期時，仍可使用本藥。  
對駕駛車輛之影響：未知。  
用於較年長婦女與較年輕女孩：到目前為止仍無這類患者使用之資料，但無論如何，本藥品使用至今，仍未發現任何特殊問題。  
詳閱使用方法：使用前請詳閱本仿單【正確使用本藥品之方法】說明。
- 【過量】 連續局部使用達來陰道錠，也無過量中毒之可能。
- 【副作用】 本藥品之副作用，一般來說輕微而且短暫，偶爾會有生殖泌尿道病變：(泌尿道有灼熱感)，陰道搔癢，陰道發炎，控制排尿能力，膀胱發炎，顯有過敏/皮膚病變出現(如：皮膚發紅、發疹，接觸性皮炎)。

- 【使用劑量】 本藥須由醫師處方使用。  
成年婦女與青春期少女：達來陰道錠療程只需單獨使用一錠之劑量，慢慢放入陰道深部，最好睡前使用。若 1-2 週後，症狀仍未完全改善時，可再使用一錠，即可獲得完全改善。
- 【正確使用本藥品之方法】  
患者平躺，雙腿微微彎曲，經達來陰道錠慢慢深入陰道中，最好睡前使用。  
建議事項：治療期間應注意個人衛生，以中性或鹼性肥皂清洗，穿棉質內褲，避免使用陰道灌洗療法。
- 【儲存】 儲存於 30°C 以下陰涼處，避免陽光直接照射。應至於兒童不易取得之處
- 【包裝】 100 錠以下鋁箔盒裝

- 【技術授權】 西班牙 Ferrer 大藥廠
- 【藥商】 科進製藥科技股份有限公司
- 【公司地址】 台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 7
- 【藥廠地址】 新竹縣竹北市生醫路 2 段 22、26 號 4 樓
- 【經銷藥商】 科懋生物科技股份有限公司
- 【電話】 (02)2655-7568