

“生達”

醫鼻易

噴鼻液 0.5毫克/毫升

(異每達佐林)

SINDECON

NASAL SPRAY 0.5mg/ml “Standard”
(Oxymetazoline)

本藥的主成分Oxymetazoline是局部血管收縮劑，主要用於緩解鼻黏膜充血、腫脹引起的鼻塞症狀。

本藥為鼻噴劑，主要作用於鼻腔位置，較無全身性的作用以及不良反應。

作用及特點：

- 1.Oxymetazoline Hydrochloride為一種交感神經興奮劑中之局部血管收縮劑，具有強力的血管收縮作用，對於鼻黏膜腫及鼻充血患者能使腫脹及充血皺縮，而且藥效迅速且持久，安全性高。
- 2.本劑對循環及一般生理狀況絕無不良影響。
- 3.本劑能減少分泌物之滲出，但並不抑制黏膜的正常分泌，故不會引起不舒服的燥熱症狀。

【成分】

有效成分及含量：每毫升含有：Oxymetazoline

Hydrochloride.....0.5mg

其他成分（賦形劑）：Sodium Chloride、Methylparaben、Propylparaben、Potassium Phosphate Monobasic、Sodium Phosphate Dibasic、Water for Injection

【用途（適應症）】

急性鼻炎、過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、鼻竇炎、鼻咽炎。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用。
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二)6歲以下。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治。
 - (一)曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、甲狀腺機能亢進、糖尿病及因前列腺肥大引起排尿困難。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量。
 - (四)噴鼻器請勿與它人共用，以免造成感染。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及6歲以上	每天1-3次，每次兩鼻孔各噴一下
6歲以下	請勿使用

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包 裝】

100毫升以下塑膠瓶裝

【類 別】

醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯 存】

25℃以下貯存。

衛署藥製字第035546號 Code No.LS-02 2214120



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區土庫里土庫6之20號