

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Keppra Tablet - 500 mg

藥物學名: Levetiracetam (優閒膜衣錠)

藥品外觀: 黃色橢圓形錠劑, 一側有刻痕並標有「UCB」及「500」字樣



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

適用於治療局部癲癇發作, 也可用於肌抽躍性癲癇或強直陣攣發作的輔助治療。

使用方法 (Directions)

可飯前或飯後服用, 請搭配足量開水吞服。錠劑可剝半吞服, 但不建議自行分劑量使用。

忘記服藥時 (Missed dose):

如果忘了吃藥, 請檢查距離下一次吃藥的時間: 若還不到下次吃藥時間的一半, 可以立刻補吃; 若已超過時間請忽略此次, 等下個原定時間吃藥, 切勿一次服用雙倍藥量。

注意事項 (Warnings)

- 若需停藥, 請遵循醫師指示逐步減量, 勿自行停藥。
- 治療初期或調整劑量時, 可能影響反應力, 請避免開車或操作機械。
- 若出現情緒變化、憂鬱、攻擊行為或自殺念頭, 請盡快就醫。
- 若服藥後出現皮疹或過敏症狀, 請立即停藥並就醫。
- 此藥錠不適用於6歲以下兒童, 孩童劑量應由醫師精算與調整。
- 本藥品可分泌至母乳中, 授乳期間使用須經醫師評估風險與效益, 必要時應考慮停止哺乳或更換藥物。

副作用 (Side Effects)

嗜睡、頭痛、無力感、鼻咽炎、行為異常及眩暈

保存 (Storage)

室溫下儲存。若藥品未拆封, 請參考包裝上的保存期限; 拆封後的藥品最多可保存6個月, 請放置在陰涼、乾燥處。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/19 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院