

外用

"生達"速立康 軟膏

Salic (Salicylic acid) Ointments "Standard"

衛署藥製字第 030530 號 G-0804 Code No.OS-04 3216130

速立康軟膏，其主要成分 Salicylic acid，具有抗菌、抗黴菌、防腐等作用，且有軟化、溶解及剝離角質層的特殊功能，故對於香港腳、各種癬類、頭皮屑、濕疹、角化症及各種角化性皮膚炎等皆具有治療效果。

「成分」：每 Gm 含有：

Salicylic acid 25mg

「作用特點」：

1. 對抗微生物有效，特別是白癬菌類，其抗菌力可與 Phenol 相匹敵。另具有抗黴菌之作用，對香港腳有效。
2. 能溶解結合在角質層的細胞間質，而具有軟化、溶解及剝離角質層的作用。
3. 能迅速由皮膚吸收。

「適應症」：

去角質

「用法用量」：

清淨患部後，將本品適量塗擦於患部，每日 1~2 次。可先將本品塗抹於紗布後貼用，依症狀適宜增減之。醫師藥師藥劑生指示藥品。

「注意事項」：

1. 患部化膿時所產生的糜爛，須事先處理後再使用。
2. 須置於小孩接觸不到之處。
3. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
4. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
5. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
6. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外

用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。

7. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

8. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

9. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

10. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

11. 深部皮膚組織感染請就醫治療。

「警語」：

1. 對藥物各成份過敏者不得使用。
2. 大範圍及長期使用會造成水楊酸效應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。
3. 避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。
4. 不要觸碰眼部、臉部、陰部、黏膜。

「副作用」：

紅斑、搔癢、刺痛感、水楊酸效應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。

「貯藏」：

25°C 以下，密閉容器貯之。

「包裝」：

1Kg 以下瓶裝及管裝。



GMP 藥廠 ISO9001

生達化學製藥股份有限公司二廠

臺灣省台南縣新營市開元路 154 號