

抗甲狀腺劑



利 甲 錠
LICA Tablets

利甲錠(Lica Tab.)為一抗甲狀腺素的製劑，毒性比 Propylthiouracil 為低。

【成 分】

本劑每錠含 Methimazole.....5 mg

【賦 形 劑】

Lactose、Starch、Brilliant Blue FCF、Magnesium Stearate、Povidone K-30

【藥 效】

- (1) Lica 能抑制甲狀腺內分泌的產生，使過分上升的基礎代謝率 (BMR)正常化，作用比 Propylthiouracil 強。
- (2) 作用速，毒性少，但不似 Propylthiouracil 的副作用不易顯現，難以控制。
- (3) 如與 B₁ 及 Glucuronic acid 併用，效果增大，且可改善 Hyperthyroidism 下的肝機能低下。

【適 應 症】

甲狀腺機能亢進症、甲狀腺切除前預先治療。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人劑量

輕度 Hyperthyroidism 每日 15mg。

中度 Hyperthyroidism 每日 30~40mg。

嚴重 Hyperthyroidism 每日 60mg 或 60mg 以上均分成三劑，每 8 小時服一次。

維持劑量：每日 5~15mg，分三次服用。

【警 語】

1. 本藥品有引起顆粒性白血球減少症之副作用，若使用後有發燒與喉嚨痛的症狀，請即刻停止服藥且與醫師聯繫，確定是否有此類不良反應之發生。
2. 使用本藥品有引起肝炎之副作用，若有食慾不振、疲倦、噁心、嘔吐等反應時，請與醫師聯繫作進一步診斷。

【注意事項】

1. 本品可致顆粒性白血球缺乏症及甲狀腺增生過速症，尚有皮疹、蕁麻疹及關節病等副作用。
2. 服用 Methimazole 應嚴密監視，如有任何明顯不適，特別是喉嚨痛，皮膚發疹，發燒，頭痛或是一般性的不適，應立即向醫師提出報告；白血球量差異檢測將用來確定顆粒性白血球缺乏症是否已產生，尤其是病人另外服用顆粒性白血球缺乏症的藥物。
3. Methimazole 會引起血內凝血酵素原過少及流血的現象，使用期間必須檢測凝血時間，尤其是手術前。
4. 本品有肝臟毒性，對於嚴重的肝臟反應要特別注意，如有臨床上明顯的肝異常症，包括 transamine value 三倍正常的上限值，應停止本藥物的治療。
5. 懷孕婦女服用 Methimazole 會引起胎兒的傷害，此種藥物容易通過胎盤障壁，因此可能使正在發育中的胎兒產生甲狀腺腫和呆小症。
6. 懷孕期間使用最小的有效劑量，且儘可能於分娩前 2-3 週停藥，服用 Methimazole 的母親不應餵乳給嬰兒。

【禁忌】

1. 對本藥有過敏者。
2. 授乳的母親，由於本藥會分泌到乳汁中。

【交互作用】

Methimazole 會加大抗凝血劑的作用，是由於抗 Vitamin-K 活性之故。

【副作用】

(1)骨髓細胞製成的抑制作用 (2)皮膚疹、蕁麻疹 (3)顆粒性白血球減少症 (4)肝功能異常 (5)噁心 (6)嘔吐 (7)神經炎等。

【儲存條件】

請儲存於 25°C 以下。

【包裝】

6 ~ 1000 粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
新市廠：台南市新市區中山路 182 號